

避免病菌傳入。從外頭買來的廚房廢料，最好煮熟後餵給。

飼料應放在木盤或飼料槽中給與，飼料不應洒在地上。飼槽應時常洗滌清潔。

清潔飲水最好經常裝在飲水器，貯存舍內使豬隨時飲用。為增進食慾，飼料應在早晚天氣涼爽時給與（如上午六時與下午六時）。中午給與充分的青飼料。

驅除内外寄生蟲

環境不清潔，容易引起內外寄生蟲。寄生蟲使

甘藍

藍甘

甘藍與波菜（菠蘿菜）如能提早栽培提早供應，收益必定特別的好。

品種：採用本地種為宜，現在就可開始播種。

育苗：育苗期間約三十五至四十五天

。苗床須用水銀劑（如「烏斯普龍」等）

一千倍液消毒。播種覆土後撒佈BHC粉，防治黃條蠶葉蟲發生。本葉一枚展開時假植，並用塑膠布架覆蓋。至本葉三枚以後儘量曝曬陽光。傍晚灌水

量不要過多，以免菜苗徒長。

移植：本葉七、八枚時移植本圃，選擇冲積砂質壤土或排水良好的水田栽培。灌水不須灌注於根部。灌至成活為止。以

後需輕輕地中耕。肥料多用腐熟堆肥。追肥應在下雨後施肥。最後一次追肥最好採用尿素。如在生育期間遭遇颱雨，可用手或腳，順着風向將植株壓倒，並用稻草覆蓋，防止蔬菜損害。

病蟲害防治：本圃最好先施用「阿特靈」防治地下害蟲。夜盜蟲用二五

%DDT乳劑五百倍液驅除。發生根朽病的地方，可用「西藥生石灰」或「烏斯普龍」消毒，預防傳染。露菌病預防，可用「大生七八」四百倍，於發

猪減低抗病力，容易受病菌侵害而致病、死亡。患

有內寄生蟲的猪，腹部膨大，脣部吊起，毛粗亂，

發育不佳，但是不會發燒（即體溫升高），有時咳嗽，有時則無。在管理上，應保持猪舍及猪運動場的清潔衛生，以預防寄生蟲寄生，此外還應定期施行驅蟲。

驅蟲藥的應用，應請獸醫指示。一般驅蟲藥的毒力很強，用量太少無效，太多却有害猪的健康，要特別小心。

時常洗刷，保持猪身體的清潔，就可避免外寄蟲寄生。

生前噴射二至三次。球部葉邊變褐色（所謂邊燒），是因為土壤酸性過強的緣故，應用石灰中和。

品種：採用本地種或禹城種為宜。本圃應採用冲積砂質壤土，前作會施用多量堆肥的土地最好。先用「阿特靈」消毒土壤並用石灰中和土壤酸度（每十公畝施用七十五公斤）。種子須用「烏斯普龍」消毒（參看十卷一期），並須催芽。

播種量應比九月以後播種時提高二至三成。播後用稻草稀疏覆蓋畦面。

播種：七月下旬至八月上旬就可開始播種。

施肥：夏天使用人糞尿，容易引起傷害，所以

應儘量少用人糞尿，假如採用條播時，須施於條與條之中間，並選下雨後施用。改用尿素最好，但在夏天濃度不可過高。有噴酒灌溉設備的菜農，可在灌溉時舉行尿素追肥。

病蟲害防治：露菌病與枯病發生激烈，應在生育初期噴射「烏斯普龍」一千倍液，於木葉二、三

枚時再噴「大生七八」四百倍液。

青蟲、夜盜蟲可用二五%DDT乳劑五百倍防


治。蚜蟲用「馬拉松」或「魚藤精」防治。

設置蔭棚與水池

夏季因為天氣熱，豬的生長較慢。豬的汗腺不

發達，不出汗，很怕熱，所以，豬的運動場要有遮蔽，設置，使豬有陰涼休息的地方。

運動場中應用水泥建成一淺水池，深度約三、四寸。一坪的面積，可供四隻肥豬同時入浴。浴池應建於蔭棚外側，不宜在蔭棚內。浴池內的水要經常更換，以保持清潔。據美國路易安那大學試驗的結果，有水浴的肥豬，每日增重要比沒有水浴的多半磅左右（二二二·五公分）呢。



(左)草稻蓋叢(右)株植倒壓前裹來風