

你想提高甘蔗栽培的效益嗎？

——秋植甘蔗園間作落花生，將帶給你一萬元額外收入——

近年來本省落花生需要量逐年增加，如能在蔗園間作花生，增加花生生產，自然是好事，但是必須注意栽培方法，才不致影響甘蔗產量太大。

秋植、春植，及宿根三種甘蔗，都可以間作落花生，下面先介紹秋植甘蔗間作落花生時，應注意的幾點。

輕鬆土壤

最為適宜

落花生喜鬆土，所以間作土地，以砂土、砂壤土最為理想，壤土次之，粘土不適宜。

在前作物如甘藷、胡椒等收穫以後，每公頃施用堆肥或厩肥約兩萬公升。

基肥施了以後，為避免養分損失起見，立即開始整地。

整地方式以甘蔗為主，先翻耕耙平，再根據甘蔗行距一·二〇至一·二五公尺開行。甘蔗植溝不宜太深，溝底至溝頂十五至二十公分，同時每隔八至十二公尺開一橫溝。田區大的，每隔三十至五十畦還需留兩行甘蔗位置開一縱溝，四周設環溝，以利排水。

甘蔗花生同時播種

甘蔗放種：在目前，甘蔗品種多用NCO三一〇，株距四十公分，八月底以前用斜播法種植，每

公頃約用雙芽苗二萬支。

落花生播種：甘蔗種植以後，隨即播種落花生。播種前，先把畦頂（即落花生之植床）耙平碎土，除去雜草。通常是每畦間作，在每一畦頂上播種落花生二至三行（最好是兩行）。假如種植三行，行株距為三〇×二〇公分，假如種兩行時，行距三十五至四十公分，株距十至十五公分。


在耙平的畦頂開淺溝兩條（如種三行即為三條）溝深五至八公分，用點播法播種。假如種子飽滿充實，土壤水分合適，每次只需播一粒種子，每公頃種子用量五至六十公升。

落花生品種用「臺南白油豆一號」，種子要用藥消毒，通常用「賜保根」粉劑與種子充分拌和，一公斤種子用「賜保根」二至三公升。播種後視天氣晴朗程度，略蓋薄土一、二公分。

補植·施肥·中耕培土

補植：甘蔗在植後兩星期內兩芽中無一芽萌發時，才需要補植。落花生在播種後三至五日發芽，假如缺株，應立即補植。

施肥：甘蔗在植後兩星期內兩芽中無一芽萌發時，才需要補植。落花生在播種後三至五日發芽，假如缺株，應立即補植。



嘉清河種子行

歷史悠久，名不虛傳的種子專家，「清河種子行」本年度又改良出品多項優良新品種，本年度農曆四月中有一位農友栽培第一項貢獻的「新改良早生30天青粉葉包心白菜子」二萬兩，約栽培二分地於六月旬收穫，計共五十餘日期間，獲得豐厚餘元的收益，其他有栽培該品種的農友均同樣獲得同等的收益，此是優良品種所得也，尚多項新品種繼續供應希各位農友們勿失良機，多多利用，清河種子行之各項品種雖是優良，但年年仍繼續改進，各項品種逐年優益，本年度品種比去年度更加優良也，各項夏秋季優良品種提供於下：

新改良早生30天青粉葉包心白菜、早生28天黃葉包心白菜、早生30天黑葉包心白菜、早生35天黑葉包心白菜、早生50天純白結晶花椰菜、早生55天純白結晶花椰菜、新品種50天早生雪白花椰菜、新品種中生早70天硬晶雪白花椰菜、早生40天長種馬耳松菜頭、大白松菜頭、冬瓜白菜頭、目瓜（臺中特選青皮白刺）、早生60天扁圓型甘藍菜、豆仔薯（正烏山扁圓型）、赤葉包心芥菜、早生黃心白骨芥菜、早生白葉白骨芥菜、大號白菊菜、長岡交配一號甘藍菜、三池中生甘藍菜、金澤結頭菜、金門結頭菜、日本長岡交配福壽二號、日本長岡交配大型福壽二號、美國派遜二號、美國大五寸人參、美國大粒甜蕃薯、美國球型洋蔥（巴比502）、清河改良大白菜、純正青江白菜、純正80天油甘菜、特大葉虎耳多荷、白粉葉格藍菜、九子晚生高脚菠菜、柿型二號、十石大豆、正蘇魯種木瓜。

其它各色種子陸續入荷，希照會。菌病特效藥，大生78及蟲害特效藥和噴霧器等在庫均備。

敝行一九六〇年度「清河新園藝栽培法」已出版了，內容豐富各項品種有詳細的說明，是蔬菜栽培者的良友，請函索付郵票二元（工本費）即寄給。

清河種子行

嘉義市中正路四八二號
電話：三五八四號
劉發儲金嘉字第八〇〇三七號

—Pacific—

最新最好家禽用藥劑


禽聖片錠劑

A. C. M.

(俗名：紅藥片)

主治：雞、火雞、鴨、鵝子、等傳染病細菌性疾。

主成份：氯黴素（抗生素）+三種磺胺劑
衛試藥字第 2390 號



經濟實惠
省錢省力
驚異效力
用者稱讚
嘉許獎狀
雪片而降

太平洋製藥廠

臺北市中山北路1段105巷90號 TEL: 47086

至六個月施第二次追肥。每公頃氮素二百公斤，磷素七十五公斤，鉀素一百五十公斤，兩次平均分施。

落花生在播後十五至二十日施追肥一次，每公頃氮素二十公斤，磷素三十公斤，鉀素四十公斤。

氮素重量乘五就是硫酸銨的重量，磷素乘五，五就是過磷酸鈣的用量，氯化鉀以鉀素乘二計算，中耕除草落花生播種以後，開花以前，應適時中耕除草，通常一、二次已足。中耕除草時，應同時整地，使落花生開花以後子房柄容易伸入土中。

落花生生育期間，甘蔗應照常除草。因落花生生長茂盛，邊蓋畦頂，雜草往往較單作時少，假如溝底株間有雜草，需用鉤頭或人工拔除。在開作落花生期間，甘蔗受到遮蔭影響，分蘗較少，大培土不妨稍遲，落花生收穫後也不宜立即培土。

一百二十日採收花生

落花生於播種後一百一十至一百二十日，或第

一次開花後八十至九十日，葉片普遍變黃，基部葉片脫落，植株拔起可見許多飽滿充實的莢果，莢殼內側已經着色，網膜顏色加深，殼壁漸薄而硬化時採收。

收穫應擇晴天，在鬆鬆土壤可用人工拔起植株，振落泥土，摘取莢果。雨後土壤板結，可用鋤頭掘起。為節省勞力，今後希望用機械收穫。

莢果在夏季晒五至七日，冬季七至十日，使種子含水量不超過百分之十為止，與秋植甘蔗間作的落花生，假如生長良好，每公頃乾莢果產量可達一千五百公斤以上。

如為留種用種子，經選種後充分晒乾，連莢果儲藏於密閉的容器內，置於清涼乾燥的地方，可確保發芽率。

收穫莢果後的落花生藤蔓，可作為家畜的青飼料，堆肥肥田材料，經一、二日晒乾可埋於蔗行的側，充作肥料。（劉步達）

註：①春植及宿根蔗園間作花生，本刊將另有專文刊出。春植及宿根蔗園間作大豆，亦將另刊專文。（請參看上期本刊）

△農業小知識▽

△一般人認為，落花生種子愈小，榨油率愈高。可是事實恰恰相反：種子飽滿，大小齊一的，榨油率才高。（林興）

注意水土保持，

防止土壤流失。

注意水土保持，

保護生命財物。

「徵求」各縣經銷商

有意者惠函索取有關資料

卓効

續効

日東
Folidol
ホルドール
乳劑

日東
マラソン
乳劑50

日東
ピーエム
乳劑50

日東
Parathion
パラチオン
乳劑
47%

日東農藥有限公司

廠址：臺北縣新店鎮七張路
廠址：北府建二字第1329號
營業處：臺北市迪化街一段七九號
TEL: 46735



農林廳登記農藥

「保證品質」

各地農會及名農藥商種子商均有售