

者的價格相差不多，那麼還是樹薯較合算。（李登元）

牧草可繼續放牧多年

攀葛草適宜本省種植

母羊分娩前不宜擠乳

母羊人工授精可學習

現在才十個月，已經受胎六十三天。我把牠推出羊乳約半升左右，請問尚未分娩就有羊乳之分泌，是否奇異？是否繼續採取？又我有一本「乳用山羊的飼養方法」的書，可是對於子宮的形成沒有圖案，敬請惠賜一張略圖及人工受精的位置及尿道收縮口及子宮收縮口的位置。（臺中市紀文河）

【問】：①「山珠兒豆」和「銀合歡」作為牧草種植，播種一次能繼續放牧多長時間（年）？②各種牧草佈置一次能連續放牧和寄生多少時間（年）？在其間應否施肥？③牧草以那一種最好？何處有購？其價若干？栽培法如何？（高雄縣山文秀成）

【答】：①「山珠兒豆」與「銀合歡」均為多年生牧草，若管理良好，能繼續放牧十年以上。②各種牧草視其生長習性，其連續放牧時間各有不同，多年生者長，一年生者以一年為限（事實上僅數個月）。牧草與其他作物一樣，需要施肥。③經試驗結果及一般經驗，牧草以不本科多年生者為主，本省最適應者為攀葛草，草苗可向鳳山高麗區農林改良場畜牧課索取。攀葛草種植方法，請參閱豐年十卷六期。（陸增輝）

炎片，請獸醫治療雖然好了，但產乳量已減少，小羊也很不健康，不知是什麼緣故？是否會傳染他羊？

【答】：①母羊於患乳房炎後，抵抗力減低，體質損傷，乳減低頗為自然，因而導致

發病，請將其送至彰化縣政府畜產課之家畜疾病診斷所，作確切的診治。

②不健康之小羊乃因吮乳不夠所致，應

補充以其他母羊乳或牛乳製品等。小羊生

出不能站立死亡，可能因（A）母羊營養不

良或有病，（B）有遺傳性致死因子。

③羊奶蛋白質含量約為三〇—五〇%

④我們現在用的精料是豆腐渣與皮等，

但豆渣內要加水飼料很稀，否則若按照農復

會「怎樣養乳羊」之飼料配法，羊乳加熱以

消毒時，便凝固成豆腐狀，便不能吃了。

⑤如羊之品種不良，則即使餵以好料亦

不會增加產乳量，應予淘汰更新之。（方清卿）

⑥如何使乳量增加？我們的羊有八隻產

到一、二瓶了。最近生了一隻小公羊，因乳

少，生也沒法子，不知是什麼緣故？是否會傳

染他羊？

【答】：①母羊於患乳房炎後，抵抗力減

低，體質損傷，乳減低頗為自然，因而導致

發病，請將其送至彰化縣政府畜產課之家畜疾病診斷所，作確切的診治。

②不健康之小羊乃因吮乳不夠所致，應

補充以其他母羊乳或牛乳製品等。小羊生

出不能站立死亡，可能因（A）母羊營養不

良或有病，（B）有遺傳性致死因子。

③羊奶蛋白質含量約為三〇—五〇%

④我們現在用的精料是豆腐渣與皮等，

但豆渣內要加水飼料很稀，否則若按照農復

會「怎樣養乳羊」之飼料配法，羊乳加熱以

消毒時，便凝固成豆腐狀，便不能吃了。

⑤如羊之品種不良，則即使餵以好料亦

不會增加產乳量，應予淘汰更新之。（方清卿）

⑥如何使乳量增加？我們的羊有八隻產

到一、二瓶了。最近生了一隻小公羊，因乳

少，生也沒法子，不知是什麼緣故？是否會傳

染他羊？

【答】：①母羊於患乳房炎後，抵抗力減

低，體質損傷，乳減低頗為自然，因而導致

發病，請將其送至彰化縣政府畜產課之家畜疾病診斷所，作確切的診治。

②不健康之小羊乃因吮乳不夠所致，應

補充以其他母羊乳或牛乳製品等。小羊生

出不能站立死亡，可能因（A）母羊營養不

良或有病，（B）有遺傳性致死因子。

③羊奶蛋白質含量約為三〇—五〇%

④我們現在用的精料是豆腐渣與皮等，

但豆渣內要加水飼料很稀，否則若按照農復

會「怎樣養乳羊」之飼料配法，羊乳加熱以

消毒時，便凝固成豆腐狀，便不能吃了。

⑤如羊之品種不良，則即使餵以好料亦

不會增加產乳量，應予淘汰更新之。（方清卿）

⑥如何使乳量增加？我們的羊有八隻產

到一、二瓶了。最近生了一隻小公羊，因乳

少，生也沒法子，不知是什麼緣故？是否會傳

染他羊？

【答】：①母羊於患乳房炎後，抵抗力減

低，體質損傷，乳減低頗為自然，因而導致

發病，請將其送至彰化縣政府畜產課之家畜疾病診斷所，作確切的診治。

②不健康之小羊乃因吮乳不夠所致，應

補充以其他母羊乳或牛乳製品等。小羊生

出不能站立死亡，可能因（A）母羊營養不

良或有病，（B）有遺傳性致死因子。

③羊奶蛋白質含量約為三〇—五〇%

④我們現在用的精料是豆腐渣與皮等，

但豆渣內要加水飼料很稀，否則若按照農復

會「怎樣養乳羊」之飼料配法，羊乳加熱以

消毒時，便凝固成豆腐狀，便不能吃了。

⑤如羊之品種不良，則即使餵以好料亦

不會增加產乳量，應予淘汰更新之。（方清卿）

⑥如何使乳量增加？我們的羊有八隻產

到一、二瓶了。最近生了一隻小公羊，因乳

少，生也沒法子，不知是什麼緣故？是否會傳

染他羊？

【答】：①母羊於患乳房炎後，抵抗力減

低，體質損傷，乳減低頗為自然，因而導致

發病，請將其送至彰化縣政府畜產課之家畜疾病診斷所，作確切的診治。

②不健康之小羊乃因吮乳不夠所致，應

補充以其他母羊乳或牛乳製品等。小羊生

出不能站立死亡，可能因（A）母羊營養不

良或有病，（B）有遺傳性致死因子。

③羊奶蛋白質含量約為三〇—五〇%

④我們現在用的精料是豆腐渣與皮等，

但豆渣內要加水飼料很稀，否則若按照農復

會「怎樣養乳羊」之飼料配法，羊乳加熱以

消毒時，便凝固成豆腐狀，便不能吃了。

⑤如羊之品種不良，則即使餵以好料亦

不會增加產乳量，應予淘汰更新之。（方清卿）

⑥如何使乳量增加？我們的羊有八隻產

到一、二瓶了。最近生了一隻小公羊，因乳

少，生也沒法子，不知是什麼緣故？是否會傳

染他羊？

【答】：①母羊於患乳房炎後，抵抗力減

低，體質損傷，乳減低頗為自然，因而導致

發病，請將其送至彰化縣政府畜產課之家畜疾病診斷所，作確切的診治。

②不健康之小羊乃因吮乳不夠所致，應

補充以其他母羊乳或牛乳製品等。小羊生

出不能站立死亡，可能因（A）母羊營養不

良或有病，（B）有遺傳性致死因子。

③羊奶蛋白質含量約為三〇—五〇%

④我們現在用的精料是豆腐渣與皮等，

但豆渣內要加水飼料很稀，否則若按照農復

會「怎樣養乳羊」之飼料配法，羊乳加熱以

消毒時，便凝固成豆腐狀，便不能吃了。

⑤如羊之品種不良，則即使餵以好料亦

不會增加產乳量，應予淘汰更新之。（方清卿）

⑥如何使乳量增加？我們的羊有八隻產

到一、二瓶了。最近生了一隻小公羊，因乳

少，生也沒法子，不知是什麼緣故？是否會傳

染他羊？

【答】：①母羊於患乳房炎後，抵抗力減

低，體質損傷，乳減低頗為自然，因而導致

發病，請將其送至彰化縣政府畜產課之家畜疾病診斷所，作確切的診治。

②不健康之小羊乃因吮乳不夠所致，應

補充以其他母羊乳或牛乳製品等。小羊生

出不能站立死亡，可能因（A）母羊營養不

良或有病，（B）有遺傳性致死因子。

③羊奶蛋白質含量約為三〇—五〇%

④我們現在用的精料是豆腐渣與皮等，

但豆渣內要加水飼料很稀，否則若按照農復

會「怎樣養乳羊」之飼料配法，羊乳加熱以

消毒時，便凝固成豆腐狀，便不能吃了。

⑤如羊之品種不良，則即使餵以好料亦

不會增加產乳量，應予淘汰更新之。（方清卿）

⑥如何使乳量增加？我們的羊有八隻產

到一、二瓶了。最近生了一隻小公羊，因乳

少，生也沒法子，不知是什麼緣故？是否會傳

染他羊？

【答】：①母羊於患乳房炎後，抵抗力減

低，體質損傷，乳減低頗為自然，因而導致

發病，請將其送至彰化縣政府畜產課之家畜疾病診斷所，作確切的診治。

②不健康之小羊乃因吮乳不夠所致，應

補充以其他母羊乳或牛乳製品等。小羊生

出不能站立死亡，可能因（A）母羊營養不

良或有病，（B）有遺傳性致死因子。

③羊奶蛋白質含量約為三〇—五〇%

④我們現在用的精料是豆腐渣與皮等，

但豆渣內要加水飼料很稀，否則若按照農復

會「怎樣養乳羊」之飼料配法，羊乳加熱以

消毒時，便凝固成豆腐狀，便不能吃了。

⑤如羊之品種不良，則即使餵以好料亦

不會增加產乳量，應予淘汰更新之。（方清卿）

⑥如何使乳量增加？我們的羊有八隻產

到一、二瓶了。最近生了一隻小公羊，因乳

少，生也沒法子，不知是什麼緣故？是否會傳

染他羊？

【答】：①母羊於患乳房炎後，抵抗力減

低，體質損傷，乳減低頗為自然，因而導致

發病，請將其送至彰化縣政府畜產課之家畜疾病診斷所，作確切的診治。

②不健康之小羊乃因吮乳不夠所致，應

補充以其他母羊乳或牛乳製品等。小羊生

出不能站立死亡，可能因（A）母羊營養不

良或有病，（B）有遺傳性致死因子。

③羊奶蛋白質含量約為三〇—五〇%

④我們現在用的精料是豆腐渣與皮等，

但豆渣內要加水飼料很稀，否則若按照農復

會「怎樣養乳羊」之飼料配法，羊乳加熱以

消毒時，便凝固成豆腐狀，便不能吃了。

⑤如羊之品種不良，則即使餵以好料亦

不會增加產乳量，應予淘汰更新之。（方清卿）

⑥如何使乳量增加？我們的羊有八隻產

到一、二瓶了。最近生了一隻小公羊，因乳

少，生也沒法子，不知是什麼緣故？是否會傳

染他羊？

【答】：①母羊於患乳房炎後，抵抗力減

低，體質損傷，乳減低頗為自然，因而導致

發病，請將其送至彰化縣政府畜產課之家畜疾病診斷所，作確切的診治。

②不健康之小羊乃因吮乳不夠所致，應

補充以其他母羊乳或牛乳製品等。小羊生

出不能站立死亡，可能因（A）母羊營養不

良或有病，（B）有遺傳性致死因子。

③羊奶蛋白質含量約為三〇—五〇%

④我們現在用的精料是豆腐渣與皮等，

但豆渣內要加水飼料很稀，否則若按照農復

會「怎樣養乳羊」之飼料配法，羊乳加熱以

消毒時，便凝固成豆腐狀，便不能吃了。

⑤如羊之品種不良，則即使餵以好料亦

不會增加產乳量，應予淘汰更新之。（方清卿）

⑥如何使乳量增加？我們的羊有八隻產

到一、二瓶了。最近生了一隻小公羊，因乳

少，生也沒法子，不知是什麼緣故？是否會傳

染他羊？

【答】：①母羊於患乳房炎後，抵抗力減

低，體質損傷，乳減低頗為自然，因而導致

發病，請將其送至彰化縣政府畜產課之家畜疾病診斷所，作確切的診治。

②不健康之小羊乃因吮乳不夠所致，應

補充以其他母羊乳或牛乳製品等。小羊生

出不能站立死亡，可能因（A）母羊營養不

良或有病，（B）有遺傳性致死因子。

③羊奶蛋白質含量約為三〇—五〇%

④我們現在用的精料是豆腐渣與皮等，

但豆渣內要加水飼料很稀，否則若按照農復

會「怎樣養乳羊」之飼料配法，羊乳加熱以

消毒時，便凝固成豆腐狀，便不能吃了。

⑤如羊之品種不良，則即使餵以好料亦不會增加產乳量，應予淘汰更新之。（方清卿）

⑥如何使乳量增加？我們的羊有八隻產到一、二瓶了。最近生了一隻小公羊，因乳少，生也沒法子，不知是什麼緣故？是否會傳染他羊？

【答】：①母羊於患乳房炎後，抵抗力減低，體質損傷，乳減低頗為自然，因而導致發病，請將其送至彰化縣政府畜產課之家畜疾病診斷所，作確切的診治。

②不健康之小羊乃因吮乳不夠所致，應補充以其他母羊乳或牛乳製品等。小羊生出不能站立死亡，可能因（A）母羊營養不良或有病，（B）有遺傳性致死因子。

③羊奶蛋白質含量約為三〇—五〇% 脂肪含量約為三·〇—五·〇%，該書所載略

版是許心芸編的，內有牛羊乳比較表：

牛乳 三〇% 二〇% 一〇% 五% 二% 一% 水

蛋白 — 脂肪 糖分 灰分 水

羊乳 四六% 七四% 五六% 一〇% 二〇% 三〇% 三〇% 二〇% 一〇% 五% 二% 一% 水

但豆渣內要加水飼料很稀，否則若按照農復

會「怎樣養乳羊」之飼料配法，羊乳加熱以

消毒時，便凝固成豆腐狀，便不能吃了。

④羊乳於擠時，擠奶人之手，所用之盛

器及羊乳頭等均應清潔消毒，否則細菌易於滋生病而致酸化，乃結成塊。新鮮清潔之乳於

亦較少。

⑤如羊之品種不良，則即使餵以好料亦不會增加產乳量，應予淘汰更新之。（方清卿）

⑥如何使乳量增加？我們的羊有八隻產

到一、二瓶了。最近生了一隻小公羊，因乳

少，生也沒法子，不知是什麼緣故？是否會傳

染他羊？

【答】：①母羊於患乳房炎後，抵抗力減低，體質損傷，乳減低頗為自然，因而導致發病，請將其送至彰化縣政府畜產課之家畜疾病診斷所，作確切的診治。

②不健康之小羊乃因吮乳不夠所致，應補充以其他母羊乳或牛乳製品等。小羊生出不能站立死亡，可能因（A）母羊營養不良或有病，（B）有遺傳性致死因子。

③羊奶蛋白質含量約為三〇—五〇% 脂肪含量約為三·〇—五·〇%，該書所載略

版是許心芸編的，內有牛羊乳比較表：

牛乳 三〇% 二〇% 一〇% 五% 二% 一% 水

蛋白 — 脂肪 糖分 灰分 水

羊乳 四六% 七四% 五六% 一〇% 二〇% 三〇% 三〇% 二〇% 一〇% 五% 二% 一% 水

但豆渣內要加水飼料很稀，否則若按照農復