

隔離預防雜交

白花芥藍菜的採種園，應與黃花芥藍菜、甘藍等作物隔離，以防雜交。隔離的最短距離如下：

作物種類	隔離距離(公尺)
黃花芥藍菜	五〇〇
甘藍、球莖甘藍、花椰菜	六〇〇
無遮蔽物一屋等遮蔽物	三〇〇
	四〇〇

注意病蟲害

比較常見而嚴重的病蟲害，有下列幾種：

- (1) 蚜蟲：初期噴射五十%「馬拉松」二千倍液。母株淘汰後(即開花之前)噴射PM二千至三千倍液。結莢後宜再噴射一次。開花期不可噴藥。
- (2) 黃條葉、菜心螟、夜盜蟲：噴射二十五%DDT乳劑五百倍液防治。
- (3) 黑腐病：噴射「賜保根」四百倍液，每隔七天噴射一次，繼續二至三次。必須加入「萬能」等展着劑，使藥劑容易附著。

本省中部七縣市本年度第一期蕉園象鼻蟲防治適期已經到了，苗栗、臺中、南投、彰化、雲林，以及嘉義等地的蕉農們，請切實按照下面的方法清理蕉園，噴施藥劑。

清理蕉園

省香蕉產銷改進委員會與臺中青果合作社規定，上(九)月二十日起十天為清園時期。香蕉象鼻蟲的成蟲畏光，白天潛伏的時候，身體喜與物體密切接觸，所以每每羣相擠集葉柄四穴中，又喜歡吃開始腐爛的香蕉組織，所以，倒折的葉株，與逐漸要腐爛的老株，都應伐倒粉碎使能迅速曬乾，減少成蟲潛伏的機會。施藥前一定要先依上述方法砍除老株和清園，假如清園不徹底，便得不到配贈藥劑，還沒清園的，請趕快清園。

領取藥劑

清園完竣後，請各集貨場會同蕉園防治隊小隊長檢查，發給清園檢查合格證，憑證申請配藥。十月一日起十天內為配藥期間。

預防香蕉象鼻蟲 請蕉農們趕快清園施藥

這次所用的藥劑為百分之五十的「地特靈」可濕性粉劑，價款由香蕉產銷改進委員會補助三分之一，其餘三分之二由蕉農自行負擔。每公頃所需藥量為〇.六六磅(〇.三公斤)。

怎樣噴藥

將藥粉加水七百倍，調成藥液使用。但在山地水源不足的地方，可用六至九倍的石灰，與「地特靈」可濕性粉混合均勻，裝入紗布袋或撒粉器，撒佈在葉柄基部的莖部與梢部。

注意事項

- ① 噴藥人員應穿長袖襯衣與長褲，戴斗笠及護目鏡、橡皮手套，掛口罩，並穿長統雨鞋。
- ② 每人每天至多只能噴藥四小時，絕不可超過時間工作。
- ③ 噴藥完畢後，應用肥皂水洗滌皮膚。(劉)



(4) 露菌病：露菌病發生嚴重時，採種量及種子充實度都會減低。所以，應在生育旺盛期至開花期噴射「大生七八」四百倍液二至三次預防。

白花芥藍菜的採種量，由氣候良否，尤其是抽苔開花期氣溫高低而定，普通十公畝地採種量為六十至一百二十公斤。

關於種子的採收、調製，以及貯藏等工作，本刊將另刊專文。

。汰淘子應，株母良不是，的寬形葉，短間節

農業小知識

△綠豆中常有煮不爛的「豆鬼仔」，這是因為在成熟期間受病蟲害或其他外界傷害而引起的，與遺傳沒有關係。(余)

△梅的品種很多，如圓形梅、二石梅仔等，應選果大，核小，肉厚的品種栽培。(蔡)

△蘭花也會受介殼蟲為害，可用五〇%「馬拉松」稀釋五百至一千倍(夏季較稀，冬季較濃)噴佈防治。(蔡)

△豆腐渣可以代替混合飼料中的其他部份飼料，但是不可超過一成，如果超過一成時，便會使產卵雞感到營養不足。(李)

△玉米粉太貴時，可以用些麩皮代替。因為麩皮為膨鬆的飼料，假如用麩皮代替全部玉米粉，雞隻會感覺乾物質不夠。(李)

△鐵豬飼料中滲入木瓜，可以免給青飼料。

△以樹薯養與木瓜為肉豬主要飼料時，應加大豆餅十五%，麩皮十%，骨粉一%，食鹽〇.五% (百分數為全日量重量百分比) (李)