減少了百分之七十二，嚴重腐爛的箱數減少了百分之廿六。

只要施肥適當 玉米可以連作

只要施肥適當，土壤害蟲防治工作做得澈底，連作的玉米產量和輪作玉米的產量並無差異。這是美國專家們經過五年試驗後所得到的結論。

試驗的資料顯示，種植一年牧草後栽種玉米，其產量爲每英畝一三一美斗，種植牧草兩年後栽種玉米，其產量爲每英畝一二九美斗，連續四年種植玉米，其產量在最後一年爲每英畝一三〇美斗。

專家們又發現，玉米的連作，不至於破壞土壤的結構，但也不至改良土壤的結構，歸根說一句，如果土質不成爲問題，玉米的連作是好的，如果土壤的構造緊硬，養份消耗迅速，則以玉米與其他作物互相輪作爲佳。

延緩香蕉成熟 菲國已有新法

據中央社報導：「菲律賓工商部已有了一項使香蕉延緩成熟的方法。此項方法是把收割的青香蕉浸在某種濃度的礦質溶液內，經廿四小時取出，在室內溫度中涼乾。據說，這種方法可以延緩香蕉成熟達一星期，並保持成熟狀況再歷一星期。」

這個報告是馬尼拉中央大學微生物及衞生系主任加阿亞博士向工商部提出的。

這種方法如果眞的有效，對香蕉輸出國家將是一個很大的恩惠。臺灣和菲律賓每年都有大量香蕉輸入，本省香蕉輸日途中，由於成熟太快，腐爛很多，增加了輸出成本。

捕滅室內蚊蠅 應選適當時間

當你下次在室內捕滅蚊蠅的時候，最好要選一個適當的時間。如果是用蠅拍捕捉，最好是在日出之前或日落之後，這時室內昏暗，蚊蠅活動停滯，不易驚動。到了大白天，這些討厭的小動物就要在室內嗡嗡不停了，用噴霧法防治，這種情況下最有效，因爲牠們飛個不停，即使一下子噴不到牠們，牠們也會自己飛入藥霧中尋死。

許多家庭用蚊蠅藥劑，都是倚靠麻痺效果的，這種麻痺作用有時要十五分鐘才能使一個蚊蠅致命。如果你見到蚊蠅噴了再噴，直至親見牠們死後爲止，無異於浪費。

如果藥瓶上沒有寫明白，千萬不要拿家庭殺蟲藥來噴射花草。因爲一般家用殺蟲藥都是油質的，對植物的組織結構有害。

「正本清源」，是消滅蚊蠅的最好方法。蚊蠅的繁殖速度是驚人的，四月裡發現一對蒼蠅不消滅的話，如果牠們的後代都能活下法，到八月裡就有一九一、〇一〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇億隻了。因此，見到蒼蠅就把牠們消滅，日後可省很多麻煩。

蒼蠅和蚊子孵化迅速，從產卵到長成再產卵的時期很短，因此每星期能認眞的檢查一下蚊蠅的滋生處所，澈底殺除，可收很大的效果。