


「花梅」種留行自蘿白

可保證較好發芽率



平頭仔 梅花仔 浮頭仔

選擇優良母株

「梅花」種蘿蔔，是本省冬季裡作栽培普遍的一種蔬菜。為了保證較好的發芽率，希望農友們自行留種。

「梅花」種蘿蔔的系統很多，其中，最重要的有「浮頭」、「梅花仔」，及「平頭」三個系統。在普通栽培田中，於收穫前，選擇具有品種特性的優良植株，留供採種之用。品種特性可由葉部的形狀、大小、顏色，以及根部的形狀等看出。各系統地上部特徵如下表所示，根部形狀請參看右圖。

| 系統名稱 | 葉色 | 葉形 | 葉毛 | 株型 |
|------|----|---------|----|-----|
| 平頭 | 濃綠 | 葉緣缺裂呈羽狀 | 多 | 橫匍 |
| 梅花仔 | 綠 | 葉緣缺裂呈羽狀 | 少 | 稍直立 |
| 浮頭 | 濃綠 | 葉緣缺裂呈羽狀 | 稍多 | 橫匍 |
| 梅花仔 | 綠 | 葉緣缺裂呈羽狀 | 少 | 稍直立 |
| 浮頭 | 濃綠 | 葉緣缺裂呈羽狀 | 稍多 | 橫匍 |

小規模採種時，最少要選留二十株以上的母株，混合採種。不可單株採種，以免退化。

經選拔的母株，應即移植於採種圃。採種圃應

選耕土較深，富有保水力，而且排水良好的壤土或粘壤土設置。酸性至微酸性的土壤均可。砂質土因乾濕不均，成活較差。

母株的根端無須切斷。葉基部應留十二至十五公分長，以幫助成活及生長。但是留葉過長時，反而不妥。

行距七十公分，株距四十五公分。「平頭」系

統直立栽植，其他的採用斜植方法。

栽植時，須用手將表土密墳於肥大根面，以促進成活。有病害發生可能的土地，應於栽植前用一千倍「烏斯普龍」液灌毒植穴。

一公畝（百分之甲地）採種圃，約需下列的肥料：

| 肥料種類 | 總量 | 基肥 | 第一次追肥 | 第二次追肥 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 堆肥 | 二二〇公斤 | 二二〇公斤 | — | — |
| 過磷酸鈣 | 四公斤 | 四公斤 | — | — |
| 草木灰 | 一五公斤 | 一〇公斤 | 五公斤 | — |
| 尿素 | 三六公斤 | — | — | 三六公斤 |

第一次追肥在定植後三星期時開溝施用。第二次追肥在抽苔初期施用。

驅蟲防風摘心

定植成活後新芽開始生長時，應留意驅除蚜蟲。必要時噴射二千倍PM液，並施用四百倍「大生」液二至三次。施用石灰波爾多液易引起嚴重的藥害，千萬不要使用。

季節風較強時，須立竹桿為支柱，並行培土，以防倒伏。

於開花初期，將花苔先端生長點摘除三分之一，以調節成熟時期，並使種子大小整齊。

整株一次採收

大部份莢果變黃時，整株一次採收。在晴天時放置於屋外曝曬，並藉夜露使莢果面稍行醣酵變脆，以便種子脫落，但不可過長期（三天以上）雨

淋，以免種子在莢果內發芽。所以，雨天應懸掛在屋簷下風乾。充分乾燥（莢果發生脆聲）後，於下午三時許，用竹桿或赤腳踏破莢果，調製種子。

農友經驗

——桃園縣八德鄉 吳顯玉

結球白菜利用糊仔法栽培，在本省中南部已相當普遍，然而在桃園一帶，還是比較少見的。筆者服務於八德鄉農會，訪問鄉內農研班員利用糊仔法栽培結球白菜，現在將他的經驗與方法，報告給「豐年」的讀者。

本來結球白菜不用糊仔法，就是等到水稻收刈後才栽培，也不致影響翌年第一期作的播秧。利用糊仔法栽培，目的是在爭取早期市場，多得收益。

結球白菜糊仔栽培，有直接下種和育苗後移植二種方法。不管那一種方法，糊法大致是一樣的。糊下去的時期，是水稻收刈前二十天至二十五天。

選擇排水良好的水田，用小鏟將四株水稻成正方形的中心點鏟鬆，併將隨行的土壤移一點過來，混合腐熟的堆肥，做成如飯碗倒置狀的土堆，這就是要糊白菜的地方。每隔二行糊一株。在這兒要注意的是，土堆中央不可凹下，以免根部由於浸水過多而發生腐爛。

種子或種苗種下後，水份是不可缺少的事情，所以要以溝灌方式，引水灌溉，但是水位絕對不可超過土堆二分之一以上。引水最好的時間是黃昏。

等到水稻收刈後，應立即培土築畦，並行中耕。至於除草、施肥等工作，都與普通栽培法一樣，各位可以按照過去的經驗去做。

