

小米栽培要點

——元文陽·亮師陳——



如果在土質比較肥沃的地方，基肥可以免施，播種的深度，也可稍淺。

植溝開好後，將種子均勻撒播於溝內，然後行覆土。

每一公頃需要堆肥一萬二千公斤，過磷酸鈣二百公斤，氯化鉀四十公斤作爲基肥。此外尚需硫酸鑑二百公斤，做爲追肥施用。追肥時期爲幼苗出土後四十五天左右。

上述肥料爲標準用量，各位可視實際情形酌予增減；土地貧瘠時多施，肥沃時少施。

間拔中耕除草

小米（粟）適宜在氣候溫暖，雨量適當的地方栽培。在本省海拔一千公尺以下的山地，均可栽培。富於腐殖質的壤質土、砂質壤土、粘質土均能適宜。

種子開始發芽後，每隔十天，行間苗一次，共計三次（株距五至六公分）。幼苗出土後兩星期內，行第一次中耕除草及培土，以後看雜草發生情形，再行二至三次。

△佛手柑在本省除供玩賞及清供外，並無其他用途。三年前日商來臺收購佛手柑，製造蜜餞以供日人消費，於是引起本省人士之注意，但最近外銷情形如何則不得而知。（蔡）

△農業小知識▽

東區農林改良場所選育的「臺東一號」一種。

每公頃（一甲地）需種子八至十公斤。

本省各地的播種適期，南部為一月上旬至二月上旬，中部二月上旬至下旬，北部二月下旬至三月中旬。

開溝播種

播種前先將田間精密耕地兩次，並行碎土耙平，然後每隔四十五公分分距，劃開深度十五公分，寬度十二至十五公分的播種溝一條，將所需要的堆肥及化學肥料基肥，均勻施用於溝裏，然後稍行覆土，以備播種。

△本省產柑桔類中，供製蜜餞者有金柑和四季橘，製品風味品質遠勝佛手柑蜜餞，因此大量栽培佛手柑，前途殊爲危險。（蔡）

△飼養小雞，以脫脂奶粉一份對水九份（重量）為適當。（李）



，災火驚一第萬甘
，內圍(在)店(要不)通喚煙(抽)食
，來起燒若火一萬
。害真着時(減不撲)花抹拍



，素元的糖是萬甘
，護保(要)愛產增國爲
，標看人乎食(要不)通喚
。(顧看己自)顧治加着也農蔗



，友朋的位各勸奉
(種收始開)收塊門蔗在觀
，由經路對載若車
。抽(要不)通喚家大咱勸

七十年正月耕的一元素
為國增產愛保護

其男圖文