



幾種

冬季

蔬菜

的育

苗技

術。

郁文陳

茄子、番茄、辣椒、甘藍，與花椰菜等，是幾種重要的冬季蔬菜。栽培這些蔬菜，必需特別注意育苗的技術。

菜苗的好壞，對於蔬菜栽培的成績，有很大的影響。尤其是茄子、番茄、辣椒、甘藍，與花椰菜等的栽培，最需要強健無病的優良菜苗。下面是育成優良菜苗的實際方法，請菜農們參考實行。

消毒種子

高畦條播

茄科蔬菜的褐紋病、瘡痂病、萎凋病、炭疽病、果腐病、葉霉病，以及甘藍類蔬菜的黑腐病、黑斑病、根腐病等，都能由種子傳染，所以，種子要在播種前，先用藥品處理。茄科類用二千倍昇汞液浸十分鐘，甘藍類用一千倍昇汞液浸三十分鐘。消毒後用清水洗淨，晾乾後播種。

苗床應設在排水良好，而且靠近本園的地方，床土在播種三天前充分耕鬆除草，並撒布 Depachlor 粉劑（每坪用藥量十至十二公分），防治土壤中的青蟲，然後作高二十公分，闊一百二十公分左右的高畦，施腐熟細碎的堆肥和草木灰，與床土充分混合後耙平播種。播種最好用條播。在床面用細竹片每隔八公分左右作一淺溝播種。種子間的距離為一至二公分。栽培十公畝地所需苗床面積為三坪地（茄子二·五坪地）。

播種後，最好用輕鬆的燒土，覆土厚約〇·四公分。如未準備燒土時，可用砂土五〇%，細碎腐熟堆肥三〇%，草木灰二〇%的混合物代替。覆土後應再蓋草，然後充分澆水，並用一% D T 粉劑撒布苗床周圍，預防蟻害。

保持適宜的苗株間距

天氣溫暖時，播種至發芽的日數，茄子和辣椒為六至七天，番茄約五天，甘藍類三天左右。發芽的隨時除去覆草，移蓋行間。晴天乾燥時，應每天澆水二次。

菜苗長出本葉時，舉行除草及間拔一次，使株距在三公分左右。間拔後，每坪地用二百倍的硫酸銨液約十五公升追肥一次，以促進幼苗的發育。

肥水宜用。肥後施。清水。



床苗蓋覆，土燒備準

甘蔗園間作甘藷

應加強後期管理



在蔗園裡間作甘藷，可以增加甘蔗栽培的收益（請看本刊十卷十四期），但應加強後期蔗園的一般管理，才能獲得良好的成績。

入土 甘蔗株心入土，可以有效地控制甘蔗的分蘗。間作蔗園的入土時期，除在甘藷收穫直後，視幼蔗發育情形而施行以外，等待生長至分蘗有十支左右時，應再入土一次。

入土高度在三至五寸之間，但仍然是株心入土，株外不要填土。等到培土時，再在株心入土一次。高度等於培土面，然後在蔗株之外，實施培土。

培土 培土只有一次，就是最後的大培土。慣用的小培、中培，都用株心入土替代。

間作甘藷的蔗園，甘蔗發育比較緩慢，所以培土的時期也比較遲；大約自四月底五月初培起。高度和一般蔗園一樣。

鼠害防除 間作蔗園，鼠害都比較嚴重，而間作甘藷時，更是厲害。

防鼠多用「殺鼠靈」。放置毒餌的時間，從甘藷間作期中開始。此一時期，老鼠以甘藷為主食，所置毒餌如果不是香味特濃的，效果不大。在毒餌中加入花生餅，或者麻油餅少許，效果可以增加。

等待甘藷收穫以後，老鼠以甘蔗為主食，毒餌的施放要加強。直至甘藷收穫，蔗園裡都要經常保持相當數目的毒餌。

綿蚜蟲防治 因為間作園的幼蔗發育特別弱，蔗園通風較差，容易發生綿蚜蟲，應該注意防治。（湯建廣）