

？瓜越仔糊好種樣怎

——田 秋 謝——

本省中南部稻田，在第一期作收穫後，至第二期作插秧之前，有着一段空間的時間，在這時間裡，栽培越瓜最為適宜。近年來，糊仔越瓜的栽培面積已逐漸擴大，但是在栽培技術方面，還有許多需要改進的地方。

越瓜生育期短，產量高，在中南部第一期稻作與第二期稻作間栽培收益很大，可是在栽培管理上，必需注意下列的幾點：

「金線」種最受歡迎

目前本省越瓜品種，以「金線」種較受市場歡迎。「黑皮種」大都供製造醬瓜之用，價格稍廉。因此，以選植「金線」種較為有利。

近來，有的商人以混雜的種子，充當優良種子出賣，致使栽培後生育參差不齊，產量不高。所以，種子最好向試驗機關或歷年栽培有經驗的農家洽購。如能自己留種則更可靠。

移植栽培提早收成

糊仔越瓜，以往以直播法較為普遍，但以採用移植法較佳。移植法是先設置苗圃育苗後，再移植於稻田，優點是可提早越瓜的開花結實，早半個月收成，爭取早期市場。水稻收穫前三十日左右，先在田旁擇一塊空地，利用鋤頭細耕後，澆

水達到飽和狀態，耕鋤至將成土泥時為止，然後做成如茶畦的畦，再用模型器（利用鉛片由錫粘成長寬皆二台寸，深一吋半的長方形印型器）制成一塊，隔日將種子播於方塊上，每塊一粒即可。每分地須印方塊四百八十五百塊。

種子播後須覆蓋堆肥，並保持濕潤狀態。任瓜苗發芽生長至水稻收穫前十二至十五日左右，仿直播法將瓜苗移植於田間的土堆上，每堆種三株。

基肥追肥適時施用


基肥 每分地施堆肥二千台斤，硫酸銨二十台斤，過磷酸鈣五十台斤，氯化鉀四十台斤。

堆肥作為覆蓋種子之用。化學肥料三種混合均勻後，於播種前施於小土堆的小穴中，以供幼苗發根伸長後吸收利用。


追肥 ①硫酸銨每分地三十台斤，分三次施用；第一次於小培土後，第二次於大培土後，第三次於開花結實時施用。

②如有足量的人糞尿（或豬糞尿），可施於離越瓜根部二台尺處，每一星期施一次。

③利用氮磷化鈣（鳥肥）與堆肥混合，於大培土前施於小培土後的畦畔上，然後行大培土覆



苗瓜種移塊土帶



圖苗瓜越

蓋，肥效持久而良好。

日常管理注意五點

①水稻收穫後，須立即移開田間稻葉，以免影響瓜苗初期生育。

②越瓜的生育，與培土的早遲成正比，愈早培土，生育愈速，所以，稻作收穫後，立即行小培土，隔十日後再行大培土作畦。

③越瓜忌過旱與過濕，應隨時注意灌溉排水。畦間的排水溝應保持適當的水分。過旱時引水灌溉，下雨時即刻排水，以免浸水腐爛。

④為促進越瓜的早期開花結實，於越瓜蔓長一公尺時，行第一次摘心，以後每隔一星期行一次，共三至五次，可促使分枝開花結實，提高產量。

⑤越瓜的蔓葉約一公尺時，必須於畦上鋪稻草，以免瓜果與土壤接觸而腐爛或被地下害蟲蛀食為害。

越瓜自種植於田間後二十至二十五日即行開花。開花後二十日左右即可收穫，瓜重在一·五台斤左右時肉質幼嫩，最受市場歡迎，售價也高。所以須及時收穫，不可留得過久而變老化。

林永旭荔枝苗園

臺中縣潭子鄉頭家厝中山路10號

敝園為酬謝顧客愛顧，將以特價優待直接來園訂購者，敬請撥駕來園參觀，指教，毋任歡迎。

本園荔枝苗現有尺數如下

2尺上、下 3尺上、下 4尺上、下 5尺上、下 6尺上、下
7尺上、下 8尺上、下 9尺上、下 10尺以上均有

德豐牌自動式碾谷米機

本社為響應政府推行農村機械化的政策，及適應農友們的需要，近時研製小型自動式碾谷米機其特點如下

1. 利用電燈電即可。
2. 無電力之農村，可用柴油發動機，或耕耙機（鐵牛）替代。
3. 稻谷二五畝斤，直接碾成白米，只需十八分鐘。
4. 碾成之白米，絕不破碎不治米糠。如蒙賜顧，當竭誠服務。

國內外總代理

中國 華義貿易股份有限公司

總公司：臺北市延平北路二段一二五號 電話四三八八四號

德豐工程社 工廠 豐原鎮中山路五十四號 電話豐原五七二號乙

