



防治星天牛害蟲 可用地特靈粉劑



【問】：本函內附寄

檸檬害蟲標本，所寄的

是

幼蟲，它寄生在樹頭

表皮內。至於成蟲已鑽

入樹心，無法捉到，請

指示蟲名及防治法。（雲林縣李信男）

【答】：

所附標本為星天牛幼蟲，可以在四月底樹根附近塗五十%地特靈可濕性粉加水一〇〇倍，防止其產卵，現在只有用手及鐵鏟等捕殺之。（陶家駒）

防治柑桔象皮病 用石灰硫黃合劑

【問】：我的柑園裡所植幼齡柑樹，會發現柑葉帶有深紫色病狀。有此種樣相的柑樹

好似較其他的發育遲鈍，未知叫什麼病名？

同時有此病的葉，大多數會向右彎，係患病

或因施肥不當，如何治療？（苗栗縣謝全源）

【答】：查此乃發生在葉上之象皮病，此

病應在六、七、八月中各撒佈石灰硫黃合劑一百倍到八拾倍一次，可防治此疾。又撒佈

此藥時勿在中午時以免藥害。可濕性硫黃粉亦可用。（劉康鑑）

韭菜有銹病爲害 可噴大生水溶液

【問】：本信內附韭菜病害標本，用什麼藥防治比較適合？請指教。（彰化縣許榮心）

【答】：據寄來韭菜病害標本係被銹病所

爲害，可用大生七八（四〇〇倍）水溶液，每隔十天噴射一次，至收穫前一星期為止。（簡錦忠）

韭菜留種前預防霜蟲 可噴DDT乳劑等藥

【問】：一、全年開花韭菜要留種子，未知何時比較好。二、留種前預防霜蟲，用什麼農藥？（彰化縣許榮心）

【答】：一、十一月開花之花朵最適於採種，因為此時氣候乾燥種子收量和品質都較佳，且採取之種子適於春季之播種栽培。二、可噴DDT乳劑或馬拉松乳劑，如田間有一份係採收供食用，最好噴馬拉松，較為安全，但噴藥後一星期內請勿採收供食

廉老好
價牌信
機械乾燥雞糞
常有萬斤歡迎惠購

臺灣首創科學養鷄法
電臺臺北 31444
電掛 FLYWHEEL
信箱臺北 1604 號
士林鎮福林路三六八號
郵局劃撥 2766 號



日商 大地養鷄場

紐漢西名古屋三河

30天中雞 60天肉雞

24.00 40.00

初心者請告不要育雛辛苦飼育

新城預防完畢

拔堆各種第1代之交配種

150.00 肉用專用美國新種

來克亭	AA級	35.00	美日直接進口第一代附血統書
蘆花	A級	16.00	美日直接進口無附血統書
紺漢西名古屋	B級	9.00	大地第一代鑑別母雞的
三河	B級	6.00	同上各種純種無鑑別
可肉秀純種公母1對	30天中雞	24.00	初心者請告不要育雛辛苦飼育
郵資三元或訂購者奉上育雛要領一份	60天肉雞	40.00	新城預防完畢
	肉雞	另議	拔堆各種第1代之交配種

本場試驗結果可用種公×紐漢西 = F1 60天到二臺斤

永光農業 TRADE MARK

信用最好

永光農業

政府檢驗合格
官認證農業第C07號

巴拉松
乳劑 47%

PM
乳劑 50%

馬拉松
乳劑 50%

安特靈
乳劑 19.5%

EM 原子利農業

確實好
水光的農業

進口各種名牌農業

永光農化五廠

台中市成功路276號 電話4661



法」撒佈西藥生石灰或噴射高米農藥劑。三
、①選擇栽培抽穗期不同的二至三品種，以
分散其受害或實行迴避其受害時期的栽培法。
。②留意育成健全的水稻或栽植抗病蟲害強
的品種。③颶風後及時噴藥。（林昌武）

鹽分地種植水稻施肥量

氮磷肥須比普通田多施

【問】：本地沿海地區鹽分甚重，播種蓬
萊稻，敝地各農民尚缺之常識，未知對稻施
肥何種肥料適合，何種不適合，每分地一次
施肥數量多少，才對稻不會影響？盼望指教
。（北門鄉王先化）

【答】：鹽分地種植水稻，以施用富含有
機質之肥料，如堆肥、豆餅、綠肥等，再併
用硫酸銨及過磷酸鈣為宜。尤其是過磷酸鈣
之施用，有緩和鹽類的有害作用，普通氮、
磷肥均須比普通田，多施用一至五倍至二倍
量。

茲列舉每公頃之施肥標準量如下（每公
頃）

肥料名	基肥	追肥	計	備註	
				公升	公升
堆肥	3000	—	3000	蓬萊種	
硫酸銨	50-100	50-100	500-1000	化學肥料加倍	
過磷酸 鈣	20-40	20-40	40-80		

施用追肥時，應視稻穀生育情形，若發見有
鹽害徵候，在插秧後至幼穗形成前，每隔
二星期，可施用硫酸銨為追肥，以助稻穀的
生活力。（石義明）

甘蔗下「四八新品種」
種植期以七八月為宜

十二期第八頁報導甘蔗新
品種「四八號」很多優點

。我們為一區看天田二分
地（原河川地）想要播種
甘蔗。這一新蔗種何時播
種？請速賜知。（臺南縣王班甲）


【答】：F「四八」種植時期，據各改良場
四十九年至五十年期舉行試驗結果，以七月
土沖刷。

或八月植為宜，缺乏灌溉之旱田與山地，更
須提早下種。春植蔗則以二月種植為宜。（
伍文耀）

栽培甘諾新品種

臺農五七號較優

【問】：一、現在春豆
(花生)已經收成了，但
在以後的一個多月的期間
，須要空閒。本人擬在此
期中種一些綠肥作物，可
是不知道有那些適於這短
期生長的綠肥作物，除豆
科作物之外有那些生長迅
速而肥分良好者，請指教
遠而肥分良好者，請指教



臺林縣李金讀（

。二、近年來甘諾栽培產量以何種為佳？三
、落花生所須的肥分最主要的是那一種？（
余慶東）

【答】：

一、只有一個月的休閒地栽培綠肥是太
勉強了，種田者亦長不高大，其他豆科以外
的綠肥作物更困難，不如耕起後使其風化。
二、甘諾新品種臺農五七號較優，或是
沖繩一〇〇號亦不錯，去農會問繁殖那一種
可以分譏。

三、氮肥對於花生是最重要的，可是花

生自己會從空中固定，無需施用硫酸銨太多，
每公頃五到六公斤即够。可施用過磷酸鈣七
十到一百二十公斤，氯化鉀三十至四十公斤

。〔余慶東〕

樹薯為粗放作物

各地都可以栽培

【問】：一、位於七星山附近荒丘經砍伐
後能否種植「樹薯」？種何物適合？

二、如種「樹薯」事先應作何準備？是
否需要肥料？行距與株距多少？是不是要將
整個地耙起後或是部份耙起就可種植？現在
市場上「樹薯」加工廠收購價格多少？（松

山會福昇）

【答】：木薯（即樹薯）為一種粗放作物

生育強健，本省各地均可栽培。但在坡地種
植，最好依等高線插植，培土起畦，以免水

土沖刷。

請全省獸醫師養豬養鷄業者注意！

臺灣之王——阿司卡利肯

（內藥登字第1464號）

「適應症」豬、鷄之蛔蟲症、結節蟲症、鞭蟲症

①效力強大——殺蟲之力量百分之九十五

以上。比任何種驅蟲藥作用高。成蟲、蟲卵均死滅絕。

②用法簡單——投藥前不須絕食，服後不須絕食。

③價格最廉——豬一頭一元，成鷄一隻僅五分代價可獲得數百倍利益。

日本東芝製藥株式會社榮譽出品

總代理臺灣獸醫儀器藥品股份有限公司
臺北市信義路二段一二〇號



信用最好 價格最廉的

富農優良蔬菜種子

● 各種 蘿蔔、小白菜、油菜、胡瓜、西瓜、蕃茄、青椒、茄子、四季豆、芥菜、芹菜。

現貨

右列各種優良品種及其他各項蔬菜種子、農藥、農具、均有。50年度
「富農園藝吉報」內容豐富附郵票二元函索即寄

◎ 各種 果樹苗、花木苗、庭園樹苗、廉價供應

富農種苗行

地址：高雄市中正四路一八〇號

郵政劃撥：高字第四〇七一四六號

苗圃：永靖鄉中山路54號九號


木薯為深根作物，種植之先，宜深耕，以利生育。在傾斜地，種植時不必先起畦，待插秧後發芽再培土成畦，行距三至四尺，株距二至三尺，每公頃可種九〇〇〇至一八〇〇株。

樹薯加工廠在中部南投甚多，臺北尚未見到。但種植較多可自行設廠加工。收購價格可逕函南投鎮農會詢問。

新墾肥沃地初年不施肥，亦有相當收量，為保持地力不宜連作，且應施用肥料為宜，每公頃基肥施用量，堆肥一萬公斤及草木灰三百五十公斤。追肥人糞尿三千六百公斤。基肥於整地時施用，追肥於株高達一至一五公尺時分二次施用。施肥之前，應行中耕除草，施肥後即行培土。生育中如為風雨吹倒，需行扶起，使迅速恢復生勢。（繆進三）

為使茶苗發育加快

可用尿素液噴葉面



加水幾倍？

（花蓮縣杜雪卿）

茶苗目前苗高十五公分者，發育似嫌欠佳。二

、早期除草，斷淺，不但可以減少雜草影響

茶苗發育，且可以切斷土壤毛細管作用，減少土壤水分蒸發。所指除草後有黃變現變，

可能為除草時有傷及幼根或鋤頭入土過深所致。三、所用鋤頭最好改用小而字耙

，除草可減少損害茶苗幼根，如該地無白蟻

為害，苗床鋪草既可減少雜草，且亦可以

防止土壤水份蒸發及苗床土壤之沖刷。四、

可用〇點六%尿素溶液噴施葉面（一公升

水加尿素六公分）。五、寄來樣本可能為切根蟲為害，可以四十%阿特靈可濕性粉加水二百至三百倍平均洒施苗床（用粉劑雖較適於茶園惟因目前正值旱期甚難深入土中）。（胡家俊）

桃樹的繁殖可行嫁接

用苦桃實生苗為砧木

根？【問】：一、桃樹繁殖是用實生苗或用是

二、種子怎樣播種及何時為適期？

三、用梅做砧木怎樣？

四、播種後要經過多少期間可接？（南投縣宗洋）

實生苗為砧木，普通採用苦桃之

成熟，在此期採種子後即播亦可，但該種子仍需待至翌年一月才發芽，一般可把種子貯藏於乾燥砂中，至十一月始播種，覆土二公分，發芽率約三十五%。

三、彰化縣一部份人士用梅作為砧木接桃，而有稍增加耐寒性之說，但未至普遍採用。

十月播種之阿薩姆茶苗，目前苗高十五公分至二十五公分不等，是否發育正常？已兩週無落雨，近日除草部份，不多幾日便有黃變現象，早期除草是否有害？為使發育加快及免

四、十二月（冬至前後）即可嫁接。（翁仁祿）

孟宗竹須常施肥料

繁殖宜用母竹栽植

【問】：一、孟宗竹在奮起湖附近（寒冷地區帶）的竹筍（冬筍）都

較別地方慢，是什麼原因？對氣候水土有沒有因？

關係？二、孟宗竹施化肥料有效嗎？用什

麼肥料有效，何時施肥是對竹仔或竹筍有效

？三、以怎樣繁殖成活力最高？四、須注意那些事項？（嘉義縣翁盛義）

【答】：一、營起湖附近海拔較高，氣候比較寒冷，所以該處的冬筍萌發，比較別地為遲。二、孟宗竹因為每年發多量的筍，故須常施肥，以增補其養料，尤以氮、鉀為重要。化學肥料之肥效雖大，但亦須施用底肥堆肥或葉綠肥垃圾等，以改良土壤物理性

於插秧後四〇四五天（分蘖最盛期）施用一次，施藥時以噴射稻株下部為主。隔兩星期左右（孕穗盛期）再施一次，藥劑應噴射全株。

現貨供應



正豐化學公司
東益貿易公司

臺中縣霧峯鄉草湖路二號
臺北市天水路三號之四

請認明拜耳商標為品質高超信用可靠之標記

看！最新的農案
英國植物保護有限公司榮譽出品

福施芬 50號

說明書備



使用福施芬
保證年年豐收
殺虫力最強 無論
任何害蟲一噴即滅
原封現貨隨時供應


包裝 100cc 500cc

總代理 英商卜內門洋碱股份有限公司

台中總經銷處

元山貿易有限公司

台南市復興路十巷四十二號



南投山地區域

可以飼養山羊

質，而促進鞭根之蔓延並早些發芽。關於施肥的時期，如用速效肥料則可於發芽前二、三週或發芽後施之，若用遲效肥料則須於至十二月間施之。三、繁殖以用母竹栽植為適宜。四、此外，如除草填土覆草病蟲害防治等，均為應注意之事項。（黃希周）

肥的時期，如用速效肥料則可於發芽前二、三週或發芽後施之，若用遲效肥料則須於至十二月間施之。三、繁殖以用母竹栽植為適宜。四、此外，如除草填土覆草病蟲害防治等，均為應注意之事項。（黃希周）

母猪有死胎的原因

【問】：一、母猪每次生十二至十五隻，但生產小豬仔時，每生下三分之二或三分

陳雲
張阿寶
張政雄
董聰明
董如鑑
邱福壽
李龍森
吳石獅
柯泉洲
林火星
呂水安
陳欽炳
涂川星
曾征夫
郭火木

＊

五、南投縣山地區域，是否適合飼養山羊？（南投縣李連馳）
【答】：一、仔羊突然腹部膨大，口流泡沫，可能是腸脹脹病，當時應立即以薄荷腦液灌，稀鹽酸等內服，同時以乾草在腹部不停地用力摩擦，必要時注射強心劑，或可救活。二、下稀糞是腸卡答兒，必須投以健胃藥，如龍膽末等藥內服，或飼養中加喂歐羅肥。三、要使山羊肥大，必須注意飼養，使之充分吃肥嫩之青草，如此飼養，則易發育肥大。四、小羊生病之特效藥醫治，範圍太廣大，因為各種病有各種之治療藥品，各種病的急救法也有不同，很難回答。五、南投縣山地區域可以飼養山羊。（黃立羣）

多的仔仔患病不停伸腰，欲大小便無法排出，繼而腹部漲大，不支倒地，口流泡沫，嘴不能張開，不到一天即死亡，請問是什麼病？如何治療？

二、羊仔經常流鼻涕，及經常排稀屎，是什麼原因，怎樣防止與治療？有何急救辦法？

三、山羊如何飼養肥大？

四、羊仔生病，是否有特效藥醫治？有何急救辦法？

【問】：一、七月

三天不食，全身常會發抖。

二、母豬分娩後，食慾不佳，有時二至三天不食，全身常會發抖。

三、母豬分娩以後，若食慾不振，注盤尼黴素或盤尼黴黴素，消炎，（二百斤左右者應注多少數量）不可否？

四、肉猪約生長至一五〇斤左右時有時後腳一肢無力，無法起身，食慾不佳，是何原因？（花蓮陳清宰）

【答】：一、據你所說的情形，可能是因爲有死胎的緣故，致生產時間延長。死胎的原因很多，主要者爲遺傳，營養或因胎數過多所引起。

二、母豬因生產用力過度，至爲辛苦。故產後頭數日常胃口欠佳，這是不要緊的，飲水，濃厚飼料應逐漸增加，至一星期或十天才給全量。

三、一般情形無須治療，請獸醫檢查體溫如有升高，則請獸醫處方診治較妥當。

四、肉猪生長約一五〇臺斤是達可屠宰之體重。後腳一肢無力可能受傷所致，請檢查有無傷口，有傷口時應用濃的過錫酸鉀溶液洗傷口，再塗撒消炎粉即可，傷癒後，冒口自然恢復。（李登元）

之二之際，即會停止，一至二小時，方再繼續生產，不滿此時生下的小豬皆頭隻會死，次者尚好，連續三兩隻之後，又會停止，以後所生者皆生下即死（分娩三小時以內所生者都無問題，但以後生者都死）。

二、母豬分娩後，食慾不佳，有時二至三天不食，全身常會發抖。

三、母豬分娩以後，若食慾不振，注盤尼黴素或盤尼黴黴素，消炎，（二百斤左右者應注多少數量）不可否？

四、肉猪約生長至一五〇斤左右時有時後腳一肢無力，無法起身，食慾不佳，是何原因？（花蓮陳清宰）

【答】：一、據你所說的情形，可能是因爲有死胎的緣故，致生產時間延長。死胎的原因很多，主要者爲遺傳，營養或因胎數過多所引起。

二、母豬因生產用力過度，至爲辛苦。故產後頭數日常胃口欠佳，這是不要緊的，飲水，濃厚飼料應逐漸增加，至一星期或十天才給全量。

三、一般情形無須治療，請獸醫檢查體溫如有升高，則請獸醫處方診治較妥當。

四、肉猪生長約一五〇臺斤是達可屠宰之體重。後腳一肢無力可能受傷所致，請檢

查有無傷口，有傷口時應用濃的過錫酸鉀溶液洗傷口，再塗撒消炎粉即可，傷癒後，冒口自然恢復。（李登元）

可樂與加裕（コロイカル）

家禽、家畜、蚕魚、營養飼料素、強壯保健劑

製造元 白石カルシウム株式會社

強力安離素（ノキサリン）

鴨之球蟲症治療及預防家禽霍亂（コレラ）之預防
鴨之感冒咳嗽治療，豬之赤痢（出血性下痢性）

強力寧禽片（ヘルミノツク錠）

出品廠 大和化學工業株式會社東京工場

美耐元（ミネゲン）

理想的綜合強力礦物素、強健多產、激減廢鷄、促進發育、預防啄毛、防止腳弱、防止軟破卵

製造元名古屋 ミネラル飼料株式會社

日本原裝魚粉蛋白質成分50%，南美洲65%以上

日本魚精、切菜機、鷄糞乾燥機

臺灣總代理 東盈實業股份有限公司

地址：臺北市延化街1段42號

家答覆，請候本社回信。

【問】：一、母猪每次生十二至十五隻，但生產小豬仔時，每生下三分之二或三分

以上各位農友的來信，已轉請專

豐年牌農藥

◎檢驗合格登記證、農字第001 002 003號

興農化學工廠有限公司

公司：臺中市中山路一七五巷24號
電話：二六一九·三九六五
工廠：臺中縣大里鄉內新路五九號
(省農會後廍) 電話：4688