

怎樣培育健全的洋蔥球？

生進王

本省的洋蔥栽培方法，共有三種方式：一是育苗後定植於本園的移植栽培，二是直接條播或點播於本園的直播栽培，三是養成仔球，用仔球栽培的方法。

這三種不同的栽培方式，各有各的優點和缺點，但用仔球栽培時，收穫最早，可以在十一月下旬至十二月之間供應市場，賣得很好的價錢（請參看本刊六卷十四期）。然而，要養成充實而且健全的仔球，並不是一件容易的事情。本文就是要告訴你這些秘訣。

在本省栽培洋蔥，可以採用移植栽培、直播栽培，和仔球栽培三種不同的方式。但用仔球栽培時，收穫最早，可以賣得很好的價錢。然而，要養成充實而且健全的仔球，並不是一件容易的事情。下面就把洋蔥仔球的培育方法介紹給各位參考：

十二月—一月中旬播種


培養仔球的播種期，較普通栽培的播種期為遲。普通栽培宜使苗株長大至本葉十五至十六枚時開始結球，才可多收；但培養仔球，則需在苗株長大至本葉七至九枚時開始結球，才可獲得大小適當的仔球。

所以，播種期應在十二月至翌年一月中旬；播種太早仔球太大，將來定植後容易分球；遲播則苗齡尚未到達齡就結球休眠，仔球太小，定植後生育差。

培育仔球，可以利用普通栽培（八月下旬至九月播種）的剩餘種子（有良好的貯藏才行）。但如發芽率太差，則宜向種子行購入新種子使用，以謀發芽率。

據本省的試驗結果，仔球大小一·五至二·〇公分，重量三·二至三·七公分者，產量最高。為了養成整一而且大小理想的仔球，應注意單位播種床面積的播種密度；因為播種密度會影響苗齡。

普通每十公畝地（一分地），在採用行距三十公分，株距十公分時，應準備三萬六千個仔球。



獲得更大收益

請用  陶氏各種家畜藥品

鷄用球蟲藥

陶氏多球粉 ZOAMIX * 25.

用以混合飼料餵鷄可預防及治療多種球蟲。
優點：

- 1 · 可防治其他球蟲藥所不能防治頑性極強之盲腸出血性球虫病。
- 2 · 中，大鷄之慢性及出血性小腸球虫病，防治效能最高。
- 3 · 種鷄食用無影響，禽畜誤食無害。
- 4 · 絶不影響肉味。
- 5 · 混合飼料不損藥效，永不變質。

殺蟲劑（外用）

陶氏乃可劑 NANKOR *

適用於家庭及公共場所，防除蠅、蟑螂、蚊子、蒼蠅等害蟲及家畜體上寄生蟲。
優點：

- 1 · 可直接施用於禽畜，安全有效。
- 2 · 殺蟲力強烈，防治多種害蟲。
- 3 · 藥效持久力強，一次施用保持四~六星期。
- 4 · 用法簡便，噴霧、塗擦均可。

飼料輔助劑

陶氏甲硫氨酸 DL-METHIONINE

用以混合飼料餵禽畜以促進生長。
優點：

- 1 · 增加飼料營養，節省飼料，增進收益。
- 2 · 調節飼料中脂肪，輔助蛋白質之缺乏。
- 3 · 有魚類食餌營養值。
- 4 · 保持適宜蛋白質-熱量比率，提高飼料效果。
- 5 · 可控制飼養，適應市場需要。

用要淘汰一〇%，這樣算來，就只能養成健全的仔球二千九百六十八球。所以十公畝地所需的仔球，應有四十平方公尺的苗床始能供用，播種量為六、四公合左右。

注意施肥以促進仔球充實

苗床的肥料，也是影響仔球充實的重要因素之一。氮素過多，而且肥效過長時，鞘葉過於茂盛，易於引起病害，而且仔球充實差，頸部大，容易在貯藏中引起腐爛。所以，三要素配合應小心，最好在乾燥期之前，使它充實採收貯藏。

三、三平方公尺（一坪地）施氮素七十五公分，磷酐一百公分，鉀質七十公分左右，對於仔球發育充實均有良好效果。

噴射「大生」等防治病蟲

八、苗齡期（五—六葉）容易發生病害，應從本葉二枚時開始噴射「大生七八」四百倍液。

爲了防除蚜蟲、紅蜘蛛及刺馬等，宜噴射「馬拉松」一千倍液。

「馬拉松」與「大生七七八」可以混用，但須加用展着劑。仔球養成期間約九十至一百天，應每隔七天噴射一次，共七至八次。

地上部一半枯黃時採收

仔球宜選晴天露水已乾時採收。上午十時至下午三時最好。

通常在地面上部先端一半枯黃時開始採收。採收後陽乾三至四天，等鞘葉乾枯，仔球表皮變乾成紙狀膜後，放在竹簾繼續陰乾。晒乾時，最初一至三天不可重疊，以免發酵腐爛。

陰乾至仔球頸部縮小後，剪修鞘葉，用「西樂生石灰」粉拌和，裝入木箱中貯藏至八月。

柑桔園地面乾燥

花蓮縣玉里鎮嚴長玉農友來信說，他在該縣草溪鄉山地所經

遇苦旱不雨，葉子即呈軟弱，友人教他種植虎爪豆，不知是否有效？

像上述的柑桔園，是可以種植虎爪豆來防止地面乾燥的。但因虎爪豆生長迅速，爲防止天牛產卵及便利裾腐病治療起見，不可任其覆蓋至柑桔樹幹邊；樹幹周圍二至三臺尺附近的蔓條，都須刈除。

虎爪豆的播種適期爲二月中下旬。至夏秋開花前耕入土中。已種柑桔的土地，可在柑桔樹根分佈的外側，開掘寬一至一·五臺尺，深一·五至二臺尺的小溝，將虎爪豆枝蔓埋入，再用土上覆蓋。種子可向當地鄉鎮公所或鄉鎮農會購買。（翁仁祿）

柑桔園地面乾燥
可種虎爪豆保護

花蓮縣玉里鎮嚴長玉農友來信說，他在該縣草溪鄉山地所經


遇苦旱不雨，葉子即呈軟弱，友人教他種植虎爪豆，不知是否有效？

像上述的柑桔園，是可以種植虎爪豆來防止地面乾燥的。但因虎爪豆生長迅速，爲防止天牛產卵及便利裾腐病治療起見，不可任其覆蓋至柑桔樹幹邊；樹幹周圍二至三臺尺附近的蔓條，都須刈除。

虎爪豆的播種適期爲二月中下旬。至夏秋開花前耕入土中。已種柑桔

的土地，可在柑桔樹根分佈的外側，開掘寬一至一·五臺尺，深一·五至二臺尺的小溝，將虎爪豆枝蔓埋入，再用土上覆蓋。種子可向當地鄉鎮公所或鄉鎮農會購買。（翁仁祿）

欲使畜禽肥壯



最佳驅蟲劑（內用）

陶氏杜蟲粉

DOWZENE * DHC

美國 陶氏化學國際公司

台灣總代理 良友國際有限公司

台北市中山北路1段30號

電話：29361-4

驅除家禽畜體內寄生蟲

優點：

- 驅除大蛔虫、蛔虫、節虫及各種胃虫、效力達百分之九十八。
- 功效迅速、一日內見效、不影響飼養程序。
- 用法簡便、可與飼料混合或加水使用。
- 費用經濟、效力優異。

* Trademark of The Dow Chemical Co., U. S. A.