

常用葡萄嫁接繁殖法三種

鄭燮

料來餵種母豬，並且給予充分運動，注意豬舍乾燥，使種母豬保持健康。

(3) 防治子宮內膜炎。為防治本病，應先防止種母豬難產及流產。如已得病，應用「配尼西林」等抗生素劑注入子宮內治療；但是醫診治。

葡萄嫁接繁殖的方法很多，常用的有芽接、呼接、割接三種。芽接最適秋天進行，呼接在夏天也可以進行，割接適於晚秋或冬天進行。

芽接

選用一〇至一二公分粗的砧木，在砧木上離地十至十五公分處作切口如圖一所示。選用接穗時，先在接穗上芽的下方作四十五度斜切，深及中隔，再在芽上方一〇至一二公分處向下切，取出芽，置於砧木切口上，再加縛束。成活後，將接芽上方三、五至五公分處以上的砧木部份剪除。

呼接

這種方法，砧木及接穗均為有根部的枝條，接活後，接穗才由母株上切下。選用粗度相似的枝條，在節處除去芽及其下木質部，然後將傷口相合縛束，成活後，砧木剪除接口以上部份，接穗剪除接口以下部份。(圖二)

割接

選用直徑二至五公分粗的砧木，在離地五至十公分處切斷，用割接刀在砧木上作二五至五公分深的切口，然後選用帶有二個芽的接穗，在基部切成斜面(向外一邊略厚，斜面長度與砧木切口長度相同)，再將接穗插入砧木切口中，使接穗與砧木的形成層相接，並加縛束。(圖三)

注意事項


嫁接時應注意下列的事項：

小知識


△嫩蔓通常在十二至二月間播種，播後約經七十天發芽。幼苗期宜常施硫酸水，到冬季時再施完全肥料一次。幼苗發育迅速，在苗床培育二、三年即可定植。栽植距離六×六公尺或七×七公尺。(蔡)

籬作物，栽培容易，插枝易得。插植時，應先開溝。插後應隨着生長時加培土，鞏固根部以免颶風時倒伏。如果經常修剪，可使側芽發生，成為很好的籬籬。(王)

- ① 接穗及砧木所作的傷口應力求平滑，不可粗糙。
- ② 可用鬆土覆蓋接口部份以防乾燥。
- ③ 發芽時，砧木常有發芽現象，應全部除去。
- ④ 嫁接時，注意使接穗與砧木傷面上的形成層相接合。



接割：三圖 接呼：二圖 接芽：一圖



，弟兄好友農勤率
，期時分開裏在現
，已守(與)甲份安好最
。平新過樂快安平



，利小貪通噲人做
，宜便貪通噲人做
，去通噲萬千場賭
。(于鼓)猜大叫人乎錢輸



，醫神叫徑一有(再)關
，錢騙來藥假用專
，病百治仙半稱自
。(騙受)耳大搞伊乎通噲