



冬天養豬， 注意豬虱！

：張聯欣：

豬虱寄生豬皮膚上，吸取血液，妨害豬安眠，減低食慾，引起貧血或營養不良，誘發濕疹性皮炎，對豬生育影響很大。冷天豬毛密生，最容易發生豬虱，請農友們注意預防驅除。

豬虱多寄生在豬皮膚上豬毛密生的部位，尤其嗜好皮膚柔軟的地方，如耳根、耳內、內股部或皮膚皺紋間（桃園種）等。

因為冬天豬毛較多，稍不注意洗刷，就會大量發生。

蟲卵粘在豬毛上

在所有動物虱中，豬虱體型最大，雄蟲四·〇公厘，雌蟲五·〇公厘，口器尖銳，體色淡褐，腹部很大。

豬虱卵黃色，梨子形，粘在豬毛上，排列規矩整齊，容易看見，不易脫落，在適當溫度下，經一至二週即孵出幼蟲。

幼蟲經二至三週，脫皮二次，就變成成蟲。雌雄成蟲交接後二十四小時，就開始產卵；一個雌蟲，每天產三至六個卵。

室溫如低於攝氏六度，蟲卵就不能孵化。蟲的壽命約為五週。如此循環，每年繁殖六至十二世代。

發癢·失眠·消瘦

虱子將很尖的口器，刺進豬皮膚內，吸取血液及淋巴液，使皮膚發痒。

所以，豬頻頻的把身體在牆壁或門上磨擦，以致豬毛斷損，皮膚癢傷，終於破裂而流出血液、淋巴液，引起濕疹性皮炎，或形成痂皮脫毛，睡眠受妨害，漸漸消瘦。

仔豬常因此而食慾減低，睡眠不足，貧血，營養不良。

BHC效力較好

殺虱藥劑的種類很多，除蟲菊、石油乳劑、DDT、BHC、牛豬安等，都可以殺死幼蟲及成蟲，但不能殺死蟲卵。噴射〇·二五%BHC乳劑，防治效果較好又較經濟。

應用此等藥劑，須在一週後重覆噴射二次，方能收得良好的效果。


買豬要當心傳染

豬虱是靠接觸傳染的，所以，從外面購進豬時，應先檢查，確認沒有豬虱寄生後，方能與自己的豬群混養。

如有豬虱，經隔離殺蟲後，也可以混飼。

豬體

與豬舍應勤洗刷，防止豬虱發生。



圖大放虱豬



上毛豬在粘卵虱虱豬的

咖啡樹易遭風害 宜選避風處栽培

咖啡性喜溫暖，忌高溫或低溫，全年平均溫度攝氏十七至二十五度，年雨量一千五百至二千五百公厘最為適宜。氣溫較低的氣候，有利於花芽的形成與開放。

冬季要較乾燥，不過乾旱期太長，也不利於咖啡栽培。

對於土壤性質，不過於苛求，但以富含有機質的壤土及火山岩土為最適宜。

海拔高度以二百至六百公尺為宜，低的要選朝北方位，以免陽光過強。

咖啡木質脆弱，易遭風害，應選擇避風區域栽培，尤以盆地為理想。

在本省，中南部及東部花蓮以南，海拔二百至七百公尺（中部以不超過六百公尺為宜）山地均可種植。

咖啡多為自花授粉，雜交較少，所以通常應用種子繁殖。

先在苗床播種育苗，播種後六個禮拜發芽，經三至四個月，幼苗長出本葉三至四對時，移植於苗床，到苗高〇·五至〇·八公尺時，可以定植。

自播種到定植需時十四至十六個月。每公頃種植二千至二千五百株。


播種用種子可向斗六鎮雲林縣經濟農場購買，每公斤四十元。

咖啡品種以阿拉伯種為優，據說臺東縣長濱鄉樟原村十二號羅品聰有苗木出售，可寫信詢問。

最適宜的栽植時期，依地區而定，以二至三月有下雨時種植為宜。

本省中南部四月常常遭遇乾旱，不宜種植，如不能於二至三月種植，就要等到五月雨量增多時種植。

（朱慶國）



實果咖啡的熟成