

在來種稻熱病特效藥

大好年

(ダイコーネン錠)

製造元 日本三笠化學工業株式會社

總經理 裕隆商行

臺中市建國路一六七號
電話：四八五五號

咖啡和一般果樹一樣，必需施肥整枝。定植時，每株施用十五至二十公斤堆肥。

定植後二個月起，施一比一的一比一的三要素肥料約一百公分，每三個月施一次。第二年施一比一的一比一肥料，每株六百公分，分別於二月、五月、九月上旬施用。

第三年施一公斤。第四年以後施二比一比四的肥料，每株約一五公斤，分三至四次施用。

咖啡也要施肥整枝！

朱慶國

整枝修剪為栽培咖啡重要工作之一。咖啡主要枝條有二種，一為向上生長的主枝，一為由主枝分生的側枝，結果都在側枝上。

今年結果的部份，明年多數不再結果，所以必需修剪。通常每株留直立主幹四至五枝，該枝結果四至五年後，即需由基部修勢，使再長出新枝。年年修剪一至二個老主枝，年年保留一至二個主枝，

即年年輪流更新修剪。

咖啡的病蟲害，在育苗期間主要有立枯病、褐眼病、介殼蟲、蚜蟲等。

定植以後，主要有有銹病、褐眼病、煤病、介殼蟲、蚜蟲、潛葉蟲等。

育苗期的立枯病，可噴稀釋五百倍的氧化銅防治。銹病為本省咖啡最嚴重的病害，除栽培抗病品種外，可採用下列直接與間接的方法防治：

①加強肥培管理，增加抵抗力。②修剪。③每年噴七—七式波爾多液二次，一在雨季開始，一在雨季結束時。在嘉義地區，六月、九月噴射二次頗為有效。

褐眼病可噴五—五式波爾多液防治。介殼蟲可噴八十倍夏油乳劑（幼樹九十倍）防治；如有粉介殼蟲，可混合馬拉松八百倍稀釋液噴射。

請採用效果確實的

植物生育促進劑

2571



- 購過任何種植物促進劑保證效力
- 提高產量提早收穫改善品質

● 現貨供應

信承農產行 彰化縣溪湖鎮員鹿路66號二
Tel. 122