


# 夏天栽培番茄的最新方法

王進生



化碳」，踏壓  
堆肥水不可太  
多，其實除了  
過乾以外，不  
須再澆水。半  
個月後，將草  
蓆除去，再等半個月就可以使用。

八月下旬至十月，是本省番茄最缺乏，也是價錢最高的時期。本文將告訴你，怎樣在七月下旬開始播種，育苗，在八月下旬至十月間採得番茄果實的最新方法。如果你過去沒有經驗，請先做一千株的小規模試驗，成功後再較大規模的栽培。

## 床土消毒、預防青枯病

番茄的青枯病菌，在攝氏五十二度下經十分鐘就會死滅，為避免青枯

病發生，必須利用「燒土法」消毒床土。方法如圖二所示。

約十五分鐘攪拌一次，使床土消毒均勻。消毒的溫度，宜在攝氏六十至七十度。

開始消毒之前，如果床土過乾，宜洒少量的水，使消毒時熱度迅速傳導。

## 應用膠塑布筒

### 培育健全苗株

△中廣公司「好農村」節目的廣播週率，從七月一日起，更改為九六〇千週。

△中廣苗栗臺「好農村」節目，是在下午八時三十分至九時播出。

△正聲公司農民電臺「農家樂」節目，是在下午八時三十分至九時播出。

△新竹臺聲臺「農民之友」節目，從七月一日起改在下午七時三十分至八時播出。

星期一、三、五客語，黎明小姐主持；星期二、四蘭南語，陳綺小姐主持。

第一花叢開花時  
病蟲為害。


最後用土覆蓋堆肥，灌注「二硫

經過「燒土法」消毒的床土，等冷卻後裝入塑膠布筒中。塑膠布筒用一分，長二八·五五公分。(次頁圖三)

，溫度已經很高，所以，須要利用「番茄多旺」一百倍液處理花叢，方可着果。

## 選擇排水良好

### 的水田做本圃



一圖  
植定柱  
集塊小立柱  
插列

害仍很嚴重，這主要是由本圃所用堆肥播散的。所以，本圃所需要的堆肥，也必須消毒。

枯病菌較少，不致引起嚴重的損害，但應選用排水良好的土地使用。

## 灌注二硫化碳消毒本圃堆肥

### 的水田做本圃

害仍很嚴重，這主要是由本圃所用堆肥播散的。所以，本圃所需要的堆肥，也必須消毒。

枯病菌較少，不致引起嚴重的損害，但應選用排水良好的土地使用。

過去大家栽在水田的番茄，青枯病為害。

到了第一花叢開花時，本時間內宜施用尿素與氯化鉀稀釋液二—三次，徹底防治病蟲害，並立短支柱。


到了第一花叢開花畢後定植，這樣可以縮短本圃生育期間，減少颱風損害和病蟲為害。

最後用土覆蓋堆肥，灌注「二硫

光強烈，容易引起日燒病，所以必須有適當的遮蔭，才可以減少損害。  
又為避免日燒病，宜採用小塊集塊方式，使它互相遮蔭，並減輕颱風損害，方法如圖一所示。

## 避免日燒損害

### 小塊集塊定植



土床毒消「法土燒」用處：二圖



購置農藥，請認明拜耳廠商標

敬當事人西德商拜耳廠股份有限公司出品農藥殺蟲劑富粒多FOLIDOL-E605又西樂生CERESAN又地特松DIPTEREX均經向經濟部中央標準局登記有案倘有他人倣冒偽造上開商標或明知為倣冒之貨物而販賣或意圖販賣者刑法有懲處專條敬當事人必予嚴究特代為登報警告切勿嘗試免蹈法網又倘有顧客向拜耳廠購得有關原料而未經向拜耳廠訂約授權使用上開商標者亦不得將該商標使用於其製品否則仍屬倣冒商標又上開商標貨品之臺灣代理商為臺北市博愛路九十八號中德貿易有限公司用戶賜顧請逕向洽購庶不致誤特此啟事至請公鑒

### 蔡六乘律師代表西德拜耳廠警告切勿倣冒農藥富粒多暨西樂生等商標啓事

蔡六乘律師事務所

臺北市廈門街九九巷三三號  
電話：二四五四九

### 分別挿立支柱

#### 防止植株倒伏

將第一花叢開花完的苗株，連同塑膠布筒搬到本園，一株一株放在栽植穴內，然後拔取木片或竹片，除去塑膠布筒後培土。

栽植深度不可過深，定植後須立支柱，並紮束以避免倒伏。  
支柱須用新的竹子，或經過消毒的竹子才好，不然也會傳染青枯病。

追肥時應儘量避免切斷根部。

病蟲害的管理，和一般栽培相同，但應縮短每次噴射的間隔日數。例

如「大生」宜每隔七天噴射一次。

採收期應比普通提早三至四天，以免引起放射狀裂果。

但在提早採收時，果實顏色不好，應放在室內（較冷的地方）催色，至桃色期才出售。

應用上述的各種技術，可以在七

月下旬開始播種育苗，在八月下旬至十月間採得番茄果實，賣得較好的價錢。如果你過去沒有經驗，請先做一千株的小規模試驗，成功後再較大規模的栽培。

註：「番茄多旺」的用法，請參看本刊第九卷第十四期「甘藍番

茄花菜的夏季栽培」和第十一卷第十七期「促進早期番茄著果的技術」二文。

分公五·八二

不10公分

木片或竹片  
不10公分

法做的筒布膠塑：三圈

