

燥。

治療的方法

如果母豬流產，須用「配尼西林」二支和開水一千至一千五百立方公分(cc)洗滌產道，並注射「配尼西林」一百三十萬單位四至五日。陰部裂傷，則用二%「來蘇液」清拭，並連用至痊癒為止。

塗佈「紅藥水」一日二次，或塗「配尼西林軟膏」。

子宮內膜炎則用「配尼西林」「鏈黴素」(康必安)一支，混合「磺胺劑」二十立方公分(cc)，蒸餾水二十至六十立方公分(cc)，用人工授精注入器注入子宮內，每天一次，連用至痊癒為止。



早生 晚生 甘藍

晉 娃

按照本省的習慣，所謂甘藍品種的早晚生，是根據栽培時期早晚來決定的。

但是在美國和日本，早晚生則指生育日數的長短；生育日數為六十日即為早生，七十五日為中生，八十五日為晚生。

一般說來，本省甘藍栽培時期，可分為早期栽培、中期栽培(十月中旬以後)、晚作栽培和夏季高冷地栽培四種；適宜早期栽培的品種叫早生甘藍，適宜秋季或晚作栽培的品種叫晚生甘藍。

適宜早期栽培的早生甘藍生育日數長(約七十五天)，耐熱，但在低溫下容易抽苔，不適宜秋季或晚作栽培。

「三池中生」、「成功」和「長岡交配一號」三個品種的特性，是比較相同的；因為「三池中生」由「成功」分離育成；「長岡交配一號」是由「成功」純系作為兩親之一而交配出來的第一代雜種。

棉花

棉花落花落鈴，有正常脫落和不正常脫落。不正常脫落的原因，有病蟲和人畜傷害、乾旱、積水等。防治方法：①良好的病蟲害防治，②注意田間排水和適當的灌溉，③田間管理操作不要傷害棉株和棉根。

鐘鈴

在香蕉開間作棉花，棉株受香蕉蔭蔽，棉株徒長，田間通風透光很差，株間濕度高，因而容易落鈴。

鐘鈴

蟲害防治不得法，沒有將為害花鈴的金鋼鑽和紅鈴蟲治好，花鈴也會脫落。棉花開果裂開後，隨時可以採收，一般棉田普通為一星期採收一次，但如人工調配不均，或環境不容許，也可延長或縮短間隔天數。(熊光斗)

「長岡交配一號」和「三池中生」的種子，本省種子店多有出售。

為發展冬季蔬菜外銷，今後最好選種在冬季不抽苔的早生品種(生育日數五十五至六十日)，而且每球不超過三臺斤(最好二臺斤左右)，但應勵行密植，以提高單位面積產量。



，味滋知了食佛假
，女婦五污積連
，去出傳聲風來後
。院法送捉來察警



，理天無人害佛假
，死半氣身失女少
，琴名名的已自着為
。去出傳張聲敢不



，娥阿活女少家吳
，寺××到來醫米
，伊編衆符用佛假
。戲巴雙房病夜半