

麥門冬通常用分株繁殖，要點如下：

- ①土質：以排水良好的砂質壤土為宜。
- ②整地：春天深耕，務使土壤疏鬆，然後加入堆肥做基肥，每公頃一萬公斤，混合均勻，並耙平土面，然後做畦，畦寬一至一·五公尺，各畦間開小溝通路，溝寬為三十公分。
- ③分株：四至五月扦插種植，每公頃需種苗二千五百公斤，約有八萬株，行株距二十公分。
- ④灌溉：扦插種植後立即灌水。
- ⑤中耕除草：每二個月行中耕除草一次。
- ⑥施肥：整地時施基肥，堆肥每公頃一萬公斤。八月、十月、二月各施追肥一次，施豆餅、過磷酸鈣、硫酸鉀或草木灰。鉀肥肥效大，需多量施用，每公頃施草木灰約三千公斤。

採收加工

栽培後次年四、五月間採挖，掘起整株，剪下帶鬚根的塊根，洗淨泥砂，置日光下翻曬三至四天後，堆積在通風處，使反潮，蒸發水氣，約三日。如此反復二至三次，即可開始第一次修剪，鬚根兩端可保留約二公分長的鬚根。曝曬二至三次，至七八成乾時進行第二次修剪，將鬚根徹底剪除。按商品大小分開，曬乾，再裝入麻袋內撞淨皮殼，過篩

葡萄施肥標準

栽植五百株計算，標準施肥量如下表所示
(公頃公頃) 並加施石灰七百五十公斤。

肥料種類	樹齡						
	二年	三年	四年	五年	六年	七年	八至十年
氮素	二〇	二〇	二〇	二〇	二〇	二〇	二〇
磷素	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
鉀素	二〇	二〇	二〇	二〇	二〇	二〇	二〇

臺灣的葡萄，應在二月中旬以前施肥，你可知道，每公頃應施多少肥料最為適當嗎？

葡萄園的施肥方法，可分溝施和全園撒施兩種。所謂溝施法，又有環施法和放射狀溝施法兩種。

葡萄園的施肥，應在修剪後立即施行，不能過遲，在臺灣，應在二月中旬以前施用完畢。

，即為商品。每公頃採收量約一千至二千公斤。

性狀鑑別

麥門冬呈紡錘形，兩頭鈍尖，中部肥滿，有的略帶鬚根，微彎曲，長一至四公分，中部直徑四至六公毫，表面黃白色，半透明，有不規則的縱皺紋。未乾透時，質較柔軟；乾後質堅硬，折斷面黃白色，角質狀，橫斷面中央有細小的木質部，氣微香，味微甜，一般認為品質較佳。

其他所產野生麥冬，表面粗糙皺，黃黑色，體型瘦小而細，纖維性強，質量較差。以表面色黃白，質細膩柔軟，肥大有光澤，內面黃白色，兩頭修淨，有香氣，味甘者為佳。(楊永裕)



冬門麥德試所試農在者作文本

最新驚人的植物ホルモン

劑已出現!!

純粹植物生長綜合賀爾蒙劑——高單位保證品質 一滴顯效

快豐收液劑

藥面撒布劑
中央標準局註冊商標第一二七一八號

AUXIN-H61

快豐收之特點：

- ①增加作物體之生長果實着花之速度並促進成熟期
- ②防止花落果改良善品質增加產量提早收成
- ③增加促芽率促進活潑力
- ④抵抗病蟲害並防止稻熱病等發生
- ⑤增加產量二成至六成
- ⑥快豐收品質絕對與他貨大不相同

製造廠神農化工廠有限公司出品

廠址 南投縣名間鄉中正村彰南路三之一

各位農友您們要優良種子嗎？

在這裡為您們介紹使您們滿意收穫!!

- 春早0天包心白菜子
- 早生30天青粉菜包心白菜子
- 早生30天星菜色心白菜子
- 一代交配番茄子
- 日本福壽二號番茄子
- 日本赤福三號番茄子
- 日本大型福壽番茄子
- 日本東湖波種子
- 純正柿型番茄子
- 優良蘋果型番茄子
- 小粒種梨仔瓜子
- 正晚生白背白葉芹菜子
- 其他種子：在庫豐富備有目錄，函索則寄，國內種子如需樣本，請付八角郵票不過要註明什麼種子以便奉贈

金蓮種子行

本行：員林鎮光明街十一號(果菜市場前)
分行：永靖鄉永興路六十一號(永靖農會邊)
郵政劃撥金中宇二〇八四五號