

番茄種子洗曬及貯藏法



【問】：處理蕃茄種子時，等果實在樹上紅了再摘下來，將種子洗好後，拿到日光下曬。爲了防止日光過於強烈，用草蓋在上面，等到曬乾了，再用布包好，收藏起來。到冬季育苗的發芽率才達三成，是何原因？（臺中縣后里鄉鄭南村枋寮路十七號（鍾清鏡））

【答】：一、你的種子洗曬及貯藏方法均有問題，請用下列方法較好。由果肉榨出之種子，宜與果漿貯在瓶或木桶內，經過發酵，至種子之膠物浮成一層白膜，始可洗淨。將洗淨的種子，放在室內風乾一、二天後，再用間接陽曬方法，晒至充分乾燥爲止。因水分尚未風乾之前，即使用間接陽曬法，其種子內之溫度會昇高，而影響其發芽力。

二、種子充分乾燥後，宜貯藏在酒精瓶內或玻璃乾燥器內，並須密封瓶口，以杜絕空氣之侵入，並須增加水分，使種子完全休眠。（王進生）

洋菇澆水時溽尿素

對增產效果很小



【問】：洋菇生產率漸降的時候，澆水時是否可以溽些尿素？最多可溽多少？

【答】：栽培洋菇，澆水時，溽些尿素，對洋菇增產效果很小，如施用不當，反而礙產。（胡開仁）

加工用豌豆

各地均可栽培

【問】：①加工用豌豆三個品種，本省北、中、南部，各以栽培何種爲宜？

②溫度如在攝氏十五度以下時，會不會影響着莢率與生長呢？

③木作物種植後，會不會影響次期作物種植期呢？（雲林縣西螺鎮吳厝里92號周世用）

【答】：①在北、中部，以滬內遠，林貢爲佳，南部雖未試作過，但也以滬內遠及林貢爲宜。萬豆生青期過長，但較耐熱，若無輪作的關係，各地均可栽培。

②三種加工用豌豆，雖喜歡溫暖的氣候，在攝氏十五度以下之溫度，也能生長着莢，故在本省，這三種受霜害之程度，較在來品種爲輕微。

③不會影響後期之水稻插秧。若有必要提早時，只要在第二期水稻收穫前十天，作糊仔栽培就好。（王進生）

西瓜種子催芽溫度



（郁宗雄）

【問】：西瓜種子催芽時，溫度須保持幾度？（雲林縣二崙鄉楊賢村五隣六號李水波）

【答】：西瓜種子催芽的溫度，在攝氏二十四至二十九度。

根菜類不宜連作

【問】：一、種過紅蘿蔔的土地，是否可以再種蘿蔔？

二、何時種紅蘿蔔是時價最高期？

三、番茄何時種植，最合時價高期？（臺北縣士林鎮溪山里六二號之一號邱紹源）

【答】：一、根菜類連作不太適宜。若前作胡蘿蔔未曾發生腐敗病及菌核病，其後作種蘿蔔還可以。

二、以紅蘿蔔最高經濟價值之生命而論，約在六月下旬至七月播種爲宜。

三、番茄在九至十月，價錢最高，故須在七月下旬，用塑膠鉢育苗（集中育苗），定植於有防風設置之地點，始可生產。爲其着果良好計，宜用植物荷爾蒙，例如愛多收或蕃茄多旺等，處理花房。（王進生）

特點：

在來種稻熱病特效藥



一、絕無藥害（據50年度臺中區農業改良場試驗報告）

二、藥效優秀（據50年度臺灣省農業試驗所試驗報告）

三、提高產量（據50年度臺中區農業改良場試驗報告）

注意：避免與安特靈等有機藥劑混合最好單獨使用。

結果增收七%

若在無發生病害區使用

（錠ン一ネコイダ）

製造元：日本三笠化學工業株式會社

總經銷：裕隆商行

臺中市建國路一六七號

電話：四八五五號

展着劑の王ミカナ展着劑 (リグトン)



永祥牌

油機 柴發 油柴 輕柴



永祥牌發動機抽水機製造

抽水工程包辦

各種外國製發動機

日製鈴江耕耘機經銷處

F B 75 58 型 柴油發動機

AA A B C 型 輕油發動機

歡迎選購 均備有現貨 供應

型式	馬力	迴轉次每分	耗油量一小時 輕油加侖	重量
YH.A型	3—4HP	1500—1800rpm	0.22	70K
YH.B型	4—5HP	1000—1200rpm	0.30	90K
YH.C型	5—6HP	1000—1200rpm	0.38	110K
YH.D型	7—8HP	1000—1200rpm	0.42	133K

永祥機品工廠

榮譽出品

店址：臺灣省嘉義市新樂街151號 電話：2167

廠址：臺灣省嘉義市永和街88號 電話：2453