


今久旱年春作注意高粱收穫

生薰林

高粱
害蟲
防治
方法
：「蜜文」
百倍噴射最為有效；高粱
抽穗時立即噴藥，經過十天如再發生，可再噴
一次。「蜜文」毒性低，



高粱夜蛾

採種

高粱
害蟲
防治
方法
：「蜜文」
百倍噴射最為有效；高粱
抽穗時立即噴藥，經過十天如再發生，可再噴
一次。「蜜文」毒性低，

蟲害：現在本省高粱的
蟲害比病害嚴重，因此必須
注意預防。高粱抽穗後的蟲
害，比較嚴重的有高粱穗蟲
和玉米螟。不為害高粱葉，高
粱開花到乳熟期，是它為害
最嚴重的時期，它在春作高
粱上為害最嚴重，並且幼蟲

，快到收穫時期了，雖然本期高粱
無雨生育較差，但是注意以下各點，相信
可以補救損失，增加你的收益的。

注意蟲害鳥害

蟲害：現在本省高粱的
蟲害比病害嚴重，因此必須
注意預防。高粱抽穗後的蟲
害，比較嚴重的有高粱穗蟲
和玉米螟。不為害高粱葉，高
粱開花到乳熟期，是它為害
最嚴重的時期，它在春作高
粱上為害最嚴重，並且幼蟲

，對人畜却可能有害，所以此外沒有特別好的方法
。祇有集中大面積栽培，或調節高粱播種期，使高
粱和水稻同時收穫，也可以減輕鳥害。

適期收穫

本省高粱栽培，是以採收子實為目的，因此宜

於完熟期收穫；熬葉變黃，種實硬化時為收穫的適
期。高粱開花，由上面開始到下面，成熟也由上面
到下面，因此，穗部下面子實已硬化，就可以收穫
。收穫時期雖因品種和播種期早晚而不同，但在本
省春作，多在六月下旬至七月上旬之間收穫。

收穫期的早晚，對產量也有密切的關係；過遲
易受鳥害，因為春作收穫期剛好是雨季，因此易使
種子發芽；過早時子實尚未完全成熟，產量較少。
收穫時，用鋸刀刈下穗部，然後運到晒場乾燥。乾
燥到含水量十三%以下才能貯藏。

穗部乾燥後，用連枷脫粒，如果大面積栽培時
，可用牛車或汽車，在晒場脫粒，然後再用風鼓調



玉米螟幼蟲專食高粱莖部，被害株容易倒伏而生育不良，高粱在剛抽穗時受害，將使結實不飽滿，子粒很小，產量大為減低。
防治法：在幼蟲尚未蝕入莖內時，用「巴拉松」一千至二千倍液噴射最有效。或和「高粱穗蟲」一樣，在高粱抽穗後約十天噴射五十%「蜜文」可濕性粉劑五百倍稀釋液。

鳥害：春作高粱的鳥害，雖然比秋作為輕，但仍須注意防治。收穫時期的鳥害，由高粱乳熟期就開始，因此高粱種子乳熟後，就需要注意監視。

目前鳥害的防治，除了雇工趕鳥外，雖可噴射「安特靈」，但防鳥的效果有限，對人畜却可能有害，所以此外沒有特別好的方法。祇有集中大面積栽培，或調節高粱播種期，使高粱和水稻同時收穫，也可以減輕鳥害。

高粱雖然是自花授粉的作物，但是雜交率較高，所以要保持品種的純度，就須在同一圃場栽培同一品種，如果要栽培兩品種時，應隔離或套袋採種，以免雜交。現在本省推廣的高粱品種，澎湖為一海格，本島是威士，如果因為種苗場所繁殖的種子有限，農友們要自己採種時，可以選用下面的倍兩種方法。

玉米螟幼蟲專食高粱莖部，被害株容易倒伏而生育不良，高粱在剛抽穗時受害，將使結實不飽滿，子粒很小，產量大為減低。
防治法：在幼蟲尚未蝕入莖內時，用「巴拉松」一千至二千倍液噴射最有效。或和「高粱穗蟲」一樣，在高粱抽穗後約十天噴射五十%「蜜文」可濕性粉劑五百倍稀釋液。

鳥害：春作高粱的鳥害，雖然比秋作為輕，但仍須注意防治。收穫時期的鳥害，由高粱乳熟期就開始，因此高粱種子乳熟後，就需要注意監視。

目前鳥害的防治，除了雇工趕鳥外，雖可噴射「安特靈」，但防鳥的效果有限，對人畜却可能有害，所以此外沒有特別好的方法。祇有集中大面積栽培，或調節高粱播種期，使高粱和水稻同時收穫，也可以減輕鳥害。

套袋隔離採種

高粱雖然是自花授粉的作物，但是雜交率較高，所以要保持品種的純度，就須在同一圃場栽培同一品種，如果要栽培兩品種時，應隔離或套袋採種，以免雜交。現在本省推廣的高粱品種，澎湖為一海格，本島是威士，如果因為種苗場所繁殖的種子有限，農友們要自己採種時，可以選用下面的倍兩種方法。

玉米螟幼蟲專食高粱莖部，被害株容易倒伏而生育不良，高粱在剛抽穗時受害，將使結實不飽滿，子粒很小，產量大為減低。
防治法：在幼蟲尚未蝕入莖內時，用「巴拉松」一千至二千倍液噴射最有效。或和「高粱穗蟲」一樣，在高粱抽穗後約十天噴射五十%「蜜文」可濕性粉劑五百倍稀釋液。

鳥害：春作高粱的鳥害，雖然比秋作為輕，但仍須注意防治。收穫時期的鳥害，由高粱乳熟期就開始，因此高粱種子乳熟後，就需要注意監視。

目前鳥害的防治，除了雇工趕鳥外，雖可噴射「安特靈」，但防鳥的效果有限，對人畜却可能有害，所以此外沒有特別好的方法。祇有集中大面積栽培，或調節高粱播種期，使高粱和水稻同時收穫，也可以減輕鳥害。

本省高粱栽培，是以採收子實為目的，因此宜於完熟期收穫；熬葉變黃，種實硬化時為收穫的適期。高粱開花，由上面開始到下面，成熟也由上面到下面，因此，穗部下面子實已硬化，就可以收穫。收穫時期雖因品種和播種期早晚而不同，但在本省春作，多在六月下旬至七月上旬之間收穫。

收穫期的早晚，對產量也有密切的關係；過遲易受鳥害，因為春作收穫期剛好是雨季，因此易使種子發芽；過早時子實尚未完全成熟，產量較少。收穫時，用鋸刀刈下穗部，然後運到晒場乾燥。乾燥到含水量十三%以下才能貯藏。

穗部乾燥後，用連枷脫粒，如果大面積栽培時，可用牛車或汽車，在晒場脫粒，然後再用風鼓調

「奈加拉」葡萄

本省目前所栽

那公賣局收購做葡萄酒原料的。但是栽培面積，不宜過於擴大。因為公賣局收購的對象，限於已簽約的農戶，由於所需的葡萄原料有限，現在並不能接受新訂約的申請。將來需要時，再由公賣局公告徵求。

凡是計劃種植「奈加拉」葡萄的農友，在