

甘蔗園間作甘藷新法 鐘

甘蔗的生長期過長，一般蔗友為增加收益起見，多在甘蔗生長初期，間作其他短期作物。蔗園間作甘藷，為常見的一種栽培法，但舊法間作甘藷，有很多缺點，使甘蔗生長受到損害。用下面所說的改良法間作甘藷，可以避免損害甘蔗的生長，使甘蔗與甘藷都獲得豐收。

選擇適當甘藷品種

(甲) 早植蔗園：最適宜的甘藷品種為「臺農五七號」，因為它諸莖短，成熟早，不會影響幼蔗發育。適於早植，最好在處暑以前種植，所以十分適合早植蔗園間作。

(乙) 晚秋植及二期糊仔蔗園：最適宜的甘藷品種為「臺農五三號」和「臺農三一號」。

選擇適當甘蔗品種

- (甲) 早植蔗園：地力較好的土地可用F一四六品種；地力較差的可用NCO三一〇。
- (乙) 晚秋植蔗園：F一四八最有利。
- (丙) 二期糊仔蔗園：NCO三一〇。

間作時期的配合

- (甲) 早植蔗園：最好甘蔗先種，甘蔗萌芽以後再種甘藷。其次為甘蔗、甘藷同時種植。
- (乙) 晚秋植蔗園：利用二期糊仔方式，在水稻尚未收穫前糊甘蔗，水稻收穫後，接着整地種甘藷。

間作蔗園的施肥

甘蔗種植之先，要施基肥，每公頃堆厩肥五千公斤以上，另加硫酸銨一百五十公斤，過磷酸鈣一百四十公斤，氯化鉀一百二十公斤。

甘蔗肥料，在和甘藷共生期中，照原定用量一半施用，另一半在甘藷收穫時施用。

日常管理的要點

甘藷生長後的甘藷莖，應按照下面三種方法，任擇一種加以管理：

- 一、每隔十至十五天翻莖一次，把進入蔗溝的莖翻上畦頂。
- 二、用黃麻藥或竹枝插在甘蔗畦兩側，防止莖進入蔗溝。
- 三、每月一次把進入蔗溝的莖刈除。

缺株補植要早，要徹底。萌芽後，要排去苗上過厚的土，以增加分蘖。除草、中耕、施肥要適時，注意灌溉。幼蔗分蘖六、七條時培土一次。防除鼠害。

甘藷莖要搬出蔗田。排開收甘藷時堆積在幼蔗基部的土壤。將尚未施用的甘蔗肥料一半，全部施入。灌溉一次。幼蔗分蘖達七、八枝時，進行第二次培土。

以後的管理工作和一般蔗園管理一樣。



代交來位列(們你)凭共
，該應不在實費浪
，愛無(也)麻明神款這
。拜款同業水齊清

，創要比醉酒人大
(幸萬)再加詳死無了創
(于肚拉)真滿然了吃(孩小)仔緊
。擬一間擬一甲滿

，來返載包小色大
，開席宴爆放金燒
(槽糟亂)猶猶朝甲吃(孩小)仔緊
。(殺)創要比醉酒人大