

? 菊杭培栽樣怎

·裕永楊·

近年來，本省栽培杭菊的風氣很盛，可是由於品種和栽培技術有好有壞，產品品質差異很大，價錢也頗為懸殊。你想栽培杭菊嗎？請照本文方法提高品質，保證銷路。

慎選品種·避免上當

杭菊有很多種類，本省栽培的，以假杭菊為多，價錢既低，銷路也差，農友選購苗株時，應該特別注意。最好的方法是親自到苗圃實地觀察，並取回鮮花樣品，請中藥店鑑定後才訂購。

慎選地點·便利排水

杭菊是一種小菊花，適合菊花栽培的氣候土壤，都適合杭菊的生長。

本省北部冬春兩季多雨，五月以後漸入乾季，有利於杭菊的第二期採收。中南部的冬春季是乾季，四、五月後漸入雨季，入秋後又成乾季，最適宜於杭菊的栽培，同時，溫度的條件也比較適合。

至於土壤方面，一般說來以上層深厚，排水良好，灌溉便利，富含有機質的砂質壤土最為適合。如果沒有這樣的土地，選用排水良好的粘質壤土亦可；但是如為水田，則宜做高畦，並注意排水。

五月扦插·自行育苗

杭菊苗除向苗商購買外，也可以自己育苗。自己育苗時，時間不宜過早，最好是在五月扦插，六月定植，十一月採收。

育苗法多用軟材扦插。選擇未有花蕾的嫩青幼枝長約四十七公分剪下，把基部二、三葉片，連葉柄去除，以株行距各十公分打插在苗床上。二十天後可澆人糞尿水，促進生長，等待移植。

六月定植·每畦兩行

發育良好的杭菊苗，在五、六月間定植。菊花忌連作。整地時行深耕，作三尺畦。在碎土時，施下基肥然後耕平。

每畦種二行，行距五十公分，株距四十五公分，每分地需苗約四千至五千株。定植深度為原來的深度。

注意灌水·勤加管理

栽培杭菊，可不必摘心除芽，也不需立支柱。定植後約十五天，行第一次除草並施追肥。以後每隔一個月行一次淺耕除


行銷世界六十國！聞名世界殺菌劑！

特多樂 鋅七五


TRITOFTOROL Z-75

主治：柑橘、菸葉、馬鈴薯、蔬菜、瓜類、小麥之病害特效。

荷蘭皇家政府檢驗合格，臺灣省農林廳檢驗合格！




信譽保證，全部原裝，超特藥效，可保增產！



王牌殺菌劑，
殺菌劑之王！
藥粒最細，
懸浮率特優！

一公斤原裝



荷蘭蒙特林白化工公司
榮譽出品
VONDELINGENPLAAT
N. V., HOLLAND.

利萬果 鋅八十

TRIMANGOL M-80

主治：瓜類、豆類、蔬菜、蕃茄、葉樹之諸種病害特效。

永興貿易行

本行：彰化市中正路三六三號
辦事處：臺北市南京西路三六號二樓

電話：511, 1075
電話：48076


草並施肥。到了第三個月，因為分蘖已多，雜草不易再成長，可不必再除草。定植初期宜勤灌水，以免影響成活和初期的發育。此外並應注意噴藥除蟲等工作。

小心施肥。促進生長

基肥在整地時施入畦中。每分地施堆肥約二千壘斤（或人糞尿二十擔），草木灰三百壘斤。使用人糞尿時，宜提前在定植前十五至二十天施用，以免發生地溫過高現象。追肥可用稀薄人糞尿或硫酸銨。每分地每次約用硫酸銨二十公升或尿素十公升，在除草淺耕時均勻撒佈畦上。栽培末期不必施肥。

防治病蟲。注意用藥

杭菊的蟲害，以蚜蟲較為常見，可噴魚藤精乳劑五百倍液或馬拉松一千倍液防治。有害農藥在結蕾後應一律停止施用，以免除毒殘留，影響品質。發生立枯病、散紋病時，可噴波爾多液或四百倍大生液。同時應拔除病株，消毒跡地。



形情花開菊杭

臺灣黃麻怎樣減低生產成本 提高單位面積產量？

季景元

（上接第二十一頁）

(3) 徹底防治病蟲害：黃麻病害應着重預防。選種抗病品種，發現害蟲時，立即選用經濟有效的藥劑撲殺，注意栽培管理，消毒種子，實施輪作，適當調節灌溉排水，增施有機肥料和鉀肥，施用氮肥不過量，注意肥料適當配合，清除麻園病株雜草等，都可以減少病蟲發生。

推行機械採剝

用棉麻所C型動力採纖機剝製黃麻鮮皮，每天十小時可剝取黃麻二十五至三十公畝，較手工剝皮可節省工費百分之十一。三倍，每公畝可節省工費用六百元左右，剝皮成本僅有手工剝皮的七分之一左右，且所剝製的鮮皮，較手工剝取者可縮短浸水日數二至三天，並可增加精洗率七多，即將推廣，值得採用。

強力殺蟲劑

スミチオン

速滅松

人畜無害 毒性低微

特點：

1. 對人畜的毒性低微，祇有巴拉松之 100 分之 1，因此可安心使用。
2. 殺蟲力、滲透力強烈，對螟蟲及其他主要害蟲之殺效優於巴拉松，且其殘留性優越。
3. 適用範圍甚廣，對水稻、大豆、果樹、蔬菜、茶等之害蟲殺滅有優越效果。
4. 對農作物不發生藥害。



日本原裝
品質保證



現貨
供應

農藥字第139號

製造元



住友化學工業株式会社

總經理處

瑞豐股份有限公司

臺北市長安西路172巷1號 電話：46640