

至於氮磷鉀三要素的比率，應為一比一比三或二比一比六，也就是說，氮和鉀素的比率，應為一比三。因為多施鉀素，有直接提高產量的效能。

插立支柱防颱

栽種香蕉，必需插立支柱，以防颱風損害。這項工作，應在五月中旬開始，支柱插入土中約一·五公尺深，支柱不但要粗大，且應捆緊，同時要隨株高上昇調整。

插立支柱時，要考慮方向。據觀察結果，抽穗方向以東南最高佔四五·六%，北向最低佔二·五%，因此，插立支柱應以東南向為主，以便抽穗後能負荷本身重量。

儘速排除積水

中南部夏季多雨，蕉園積水，使蕉葉枯黃，蕉株萎縮，根部腐敗，發育停止。即使不死亡，所生產的果實品質不好，產量也低。所以，夏季蕉園的排水工作，是不可忽略的。一定要在雨後三至五小時內將水儘速排除。

嚴防病蟲為害

①粉介殼蟲：在一至二和四至五月間發生，大多附着在蕉苗葉鞘，大株老葉片內，果實的果指頂端和果指之間。可用「大刺蟲」一千二百倍液噴射，同時用四十%「阿特靈」可濕性粉劑二百五十倍液噴佈地面，防治蟻蟻。

②象鼻蟲：在八至九，十一至十二，三至四月間為害蕉莖，鑽孔吸食汁液，破壞組織，使蕉株枯萎，倒伏而死。蟲卵多藏在不清園的老株上，因此清園是滅除該蟲的好辦法。用五十%「地特靈」可濕性粉劑七百倍液噴射二至三次亦可防治。

③萎縮病：蕉葉直立，脆弱不開張，邊緣淡黃，對陽光照射時葉片內有間斷條紋，是無藥可治的一種毒藥病。發現後，立即用煤油一百至三百公撮噴射病株，等病株腐爛後連球莖掘出，砍碎曬乾。病株附近並應噴射「馬拉松」一千倍液以殺死蟬蟲，避免病毒傳播。

雜交種玉米「臺南五號」，是以採收子實為目的，因此，果穗苞皮粘白籽粒堅硬，用指甲壓下面汁液不滲出時為收穫適期。

玉米可用簡便機器脫粒

收穫時如苞皮強緊，可用「剥皮針」收穫。收穫後應充分乾燥，並脫粒貯藏。殘留莖葉可刈為燃料或飼料。

玉米脫粒可用脫粒機。小規模栽培時可沿用農家所採用方法，即先用起子（螺絲旋）將玉米每隔三至四行突脫一行，然後再用手將兩穗相擦而脫粒。如用脫粒機，有手環式、手搖式、腳踏式、動力式等。前三式較適合小面積栽培的農友。

強力殺蟲劑

スミチオン

速滅松

人畜無害 毒性低微

特點：

1. 對人畜的毒性低微，祇有巴拉松之 100 分之 1，因此可安心使用。
2. 殺蟲力、滲透力強烈，對螟蟲及其他主要害蟲之殺效優於巴拉松，且其殘留性優越。
3. 適用範圍甚廣，對水稻、大豆、果樹、蔬菜、茶等之害蟲殺滅有優越效果。
4. 對農作物不發生藥害。



現貨供應

農藥字第139號

製造元



住友化學工業株式会社

總經理處

瑞豐股份有限公司

臺北市長安西路172巷1號 電話：46640