

## 一代雜交胡瓜

## 臺北二號栽培要點

生進王

「臺北二號胡瓜」，是由臺北區農業改良場育成的第一代雜交種，植株強壯，產量很高，品質優良，各地農友對本品種的栽培都很感興趣。

為使栽培農友更進一步瞭解本品種的特性，特將栽培方法分項說明，以供各位參考。

## 種子的選購

「臺北二號胡瓜」雖由臺北區農業改良場育成，但該場並不辦理種子繁殖。今年春季，由該場供應農林廳種苗繁殖場原種，由種苗繁殖場繁殖第一代雜種種子，目前已有足夠的種子供應農友栽培。

「臺北二號」胡瓜種子，每一百粒重量約二千粒（每穴播二粒），但如每穴播三粒，就需要九千粒種子。以種子重量來說，每十公畝地所需要的數量是一百五十五至二百二十五公克。

「臺北二號」是第一代雜交種，種子價格較貴，但因單位面積產量較一般品種多五成左右，所以種子費加重，仍不致影響農友的收益。

## 土地的選擇

土地選擇是栽培「臺北二號胡瓜」最重要的一項工作。富於有機質，而且保水力良好的微酸性至中性砂質壤土和壤土，最適合栽培「臺北二號」。

「臺北二號」在生育、結果期間，需要適當的水份，才能促進根莖的發育和伸長，所以應有灌溉設備，隨時控制水分供給。除了上述條件，如能選用下雨時不積水（排水良好）的土壤更好。

砂質土壤，都不適宜栽培。因為土地過於乾燥時，不但生育不好，容易引起瓜果變形，而且胡瓜毒素病的發生也多。

「臺北二號」對日照感應較本地大胡瓜遲鈍，且較耐高溫，所以，播種時期較長。但為雌花着生良好，仍須適期播種。

春作：北部二月下旬—四月中旬  
中部二月中旬—四月下旬

秋作：北部八月下旬—九月中旬  
中部八月下旬—十月上旬  
南部十月十一—十二月

東部八月下旬—九月下旬

秋季在高溫期播種，並在溫暖氣溫下著果採收，所以應特別注意初期管理，促進初期生育，以縮短生育期為宜。

所以，今年想種「臺北二號」的農友，應從五至十公畝的小面積開始，確定生產安定後，再擴大面積栽培。

## 怎樣施肥？

(雜交胡瓜「臺北二號」)

適量施肥，是提高

「臺北二號」產量的重要因素。「臺北二號」

的根羣分佈，都在地下二十

▲農友們的大福音：在春夏秋季可以下種栽培各種品種；由二代七十年來的新品種改良蔬菜種子專賣，臺灣唯一有名清河種子行最新改良各種優良品種供應國內外農友們安心栽培希望勿失良機敬請歡迎選購俾利收益。  
▲55天純白結島花椰菜，下種期五月至七月。  
▲60日長(短)葉純白結島花椰菜，下種期六月至九月至七月末止。  
▲早生35天葉球結島花椰菜，下種期六月上旬至七月末止。



## 嘉義清河種子行

電話：三五八一四七七  
郵局：三五八〇〇三七七



