

# 栽培蘿蔔可以葉面施肥！

本省農友種蘿蔔，有的不施肥料，有的偏重氮肥，結果都不理想。應該在基肥中施用磷肥及鉀肥，供給充足養份，才能够提高品質，增加產量。

整地時每十公畝地，全面撒布草木灰一百五十公斤，犁耕混入土中做畦。然後將硫酸銨十五公斤，過磷酸鈣二十公斤，撒在預定播種處，混合，再施腐熟水肥一千二百公斤，播種後覆土。全部磷肥用作基肥，可以促進根羣發育，並能够充分發揮肥效，提高蘿蔔品質。

蘿蔔生長期間，要分次施用「追肥」，才能够生育旺盛。早生品種播種十天後施水肥八百公斤，等到第二十天中耕除草後，再施水肥一千二百公斤和硫酸銨十五公斤。到了第三十天，再施水肥一千五百公斤。

中、晚生種蘿蔔，播種後第二星期，枝間施水肥八百公斤。第四星期中耕除草後，行間施水肥一千二百公斤及硫酸銨十五公斤。第六星期施水肥一千九百公斤。

高溫時期，蘿蔔根部的吸收能力減低，應即施行百分之〇·五—一〇的尿素水葉面撒布，並混合

「大生七九」粉劑或DDT乳劑，防除病蟲害。尿素水葉面撒布時，要噴葉背，以葉片濕潤為標準，不可噴到葉片滴水滴的程度。缺少水肥地方，更要葉面撒布尿素水。以促進生長。

蘿蔔需要的水份很多，土壤乾燥時更要灌水。最好在黃昏後引水入園地畦溝，作畦間灌溉，水位切不可高於畦面。次日早晨排水，灌水時間不宜超過十二小時。澆水澆水應在早晨，在陽光強烈照射前完成。

蘿蔔葉白天受太陽照射，發生一時凋萎的現象，有的農友們認為是土中水份不足，就在烈日下施行葉面灌水。這樣，對蘿蔔沒有好處，反而阻礙生長。應改用夜間畦間灌溉，才能够促進生長。(明)

## 農友們！

選購優良可靠的種子，請到敝公司來：「敝公司例年向美國、日本、香港及其他國家直接輸入的種子，均為各國最新優良特殊品種」；「在省內選出的種子，均為精心改良育成的超越品種」，特鄭重向你們推介：

- 蘆筍—美麗華盛頓五〇〇九號
- 紫色瑞典燕菁
- 青色瑞典燕菁
- 巴比嫩莖高莖
- 普利美大湖結球高莖
- 葛藍早生縮細高莖
- 美國黑籽細林生縮細高莖
- 坂田交配中早生甘藍
- 坂田交配梅若甘藍
- 天理交配金力甘藍
- 天理交配銀力甘藍
- 長岡交配一號甘藍
- 長岡交配早生甘藍
- 長岡交配夏時晚春甘藍
- 長岡交配六十日甘藍
- 長岡交配秋時中早生甘藍
- 長岡交配四季獲甘藍
- 長岡交配早生子持(抱子)甘藍
- 高農交配光悅甘藍
- 高農交配秀悅甘藍
- 美國長腰白菜
- 坂田交配濱光白菜

- 長岡交配理想白菜
- 長岡交配二號白菜
- 長岡交配あづま山東白菜
- 長岡交配耐病五五白菜
- 長岡交配六十日白菜
- 交配寶冠一號トマト
- 交配寶冠二號トマト
- 交配サンマーピンク一號トマト
- 交配サンマーピンク二號トマト
- 高農交配福壽二號トマト
- 高農交配福壽一〇〇號トマト
- 高農交配八號トマト
- 高農交配早生世界一トマト
- 瀧野川大長牛蒡
- 黑昇一本太葱
- 砂村根深一本太葱
- 美國大五寸人參
- 美國豐肉六寸人參
- 美國甜嫩七寸人參
- クキイ改良大五寸人參
- 藤田大五寸人參
- 美國食用甜菜
- 美國紫紅皮結頭菜
- 北京劍葉結頭菜
- 金澤結頭菜
- 金門早生結頭菜
- 雲南大頭菜
- 四川榨菜

贈送蘆筍與瑞典燕菁栽培法，函索附郵票四角即寄。

大豐種子行  
 公司：高雄市七賢二路六二號  
 電話：二一四八八號  
 行址：高雄建國三路二〇三號  
 電話：二二八三四號  
 割撥備金：臺灣一二八三九號  
 高字四〇二七七號

天津青皮甜蘿蔔(生食用)  
 天津竹筒青捲心白菜(冬菜專用)  
 香港大頭清江白菜  
 改良黑葉三五天包心白菜  
 改良五爪甲四十天包心白菜  
 改良五十天白晶花椰菜  
 豐農早生花椰菜  
 鳳山早生花椰菜  
 鳳山中生花椰菜  
 鳳山中生花椰菜  
 一代交配鳳山一號無子西瓜  
 一代交配大型新富光西瓜  
 一代交配大型新蜜寶西瓜  
 一代交配大型富寶西瓜  
 一代交配小鳳西瓜  
 新嘉寶西瓜  
 新少女西瓜  
 以上現貨供應。其他未及刊載之品種應有盡有，歡迎函詢選購。價目表函索即寄。  
 輸入元：大三貿易有限公司  
 直賣部：