

甜椒

有利的情形 路畔金品種甜椒，可外銷星馬香港等地，銷路暢旺。

栽培管理要點 ①第二期水稻宜提早收穫。②水稻收割後即行整地栽種。③稍行密植，使前期產量增加。(郁宗雄)

甘藍

有利的情形 外銷日本和香港星馬地區有望。

「坂田中早生」品種每分地收益約四五百元。

栽培管理要點 ①銷日本者選用「坂田中早生」品種。②銷東南亞者選用「交配四季種」、「兵

庫交配三號」、「松風」、「梅若」和「若竹」等品種。③切口風乾後包裝。其他請參看本期第十六頁。(郁宗雄·王進生·陳培昌)

花椰菜

有利的情形 外銷星馬地區和日本有望。

栽培管理要點 ①選用中生品種或中晚生品種

②每分地施用硼砂二公斤。③切口風乾後包裝。(郁宗雄)

莢豌豆

有利的情形 ①新鮮嫩莢外銷日本香港，向日

本輸出量十萬公斤。②冷凍莢豌豆外銷美國，輸出量五十萬公斤。③估計每分地收益六千元。

栽培管理要點 ①限中北部水田裏作。②用「在來白花軟莢」和「臺中九號」品種。③注意白粉病。④注意生育初期施肥。⑤注意採收適期。(郁宗雄·王進生)

加工甜椒

有利的情形 可做罐頭輸出歐美各國，估計每分地收益約六千五百元。

栽培管理要點 ①較適中南部栽培。②應先與加工廠訂契約。其他參看本期第三十四頁。(王進生)

今年本省甘藍外銷馬來西亞(包括新加坡、馬來亞、北婆羅洲、砂朥越)和日本等地，很有前途，但在外銷甘藍生產和收穫技術上，應當特別注意下列數點：

選擇適宜品種

臺灣過去栽培的甘藍品種，像「三池中生」和「長岡交配一號」等都是「產量本位」的品種，容易裂球、球形太大，結球不緊，很容易變色變質和腐爛，不耐運輸；同時即使能安全運達外銷市場，因球形太大，品質不佳，銷路也不好。筆者曾實地調查新馬市場和日本市場，前者歡迎重在一·二至二·〇公斤的圓球形甘藍，同時因為周年高溫多濕，須要不易變色不易腐爛的耐運品種；後者除上述條件外，更須要葉質脆嫩，甜而無辛辣味的品種，因為日本消費甘藍，大多生食。

經最近鳳山熱帶園

藝試驗分所在全省各地

作試驗結果，甘藍新品種「高農交配四季種」、「長岡交配四季種」、「兵庫交配三號」、「長岡交配時無理想」、「坂田松風」、「坂田梅若」、「坂田若竹」、「高農光悅」等品種，不易裂球，結球緊硬，抵抗軟腐病力較強，結球後留置田間，不易裂球和腐爛，收穫後雖經長期運輸，不易變色腐爛，能耐遠運，為適於外銷馬來西亞等熱帶地區的優良品種。「坂田中早生」、「坂田黑葉理想」、「大和銀力」等品種，不但早生，結球良好，而且品質優良，球形大小適中，適於外銷日本。

密植生產中小球

臺灣過去栽培甘藍，都用疏植(行距六十五至七十公分，株距五十公分)生產大球

。目前不但外銷市場需要一·二至二·〇公斤重的小球，同時省內大都市也有歡迎中小球而嫌惡大球的傾向(只有鄉村仍歡迎大球)，所以外銷甘藍，除宜選擇品種外，植株也應加以調整縮小；例如上述各新品種的行距宜在六十五公分左右，株距宜在四十至四十五公分之間。甘藍經密植後，不但球形大小適於外銷，而且單位面積的總產量也會增加，一舉二得。

注意缺硼症

多硼素，因此，目前本省所產甘藍，時常發生缺硼症；最顯着的病徵是葉球切取後，切口中心發生或大或小的黃褐色水漬狀變色部份，或甚至腐爛成空洞，因此在運輸途中，球莖部切口處更易腐爛，嚴重影響商品價值。

郁宗雄

為防止缺硼症的發生，一分地甘藍宜用一

公斤的硼砂混和在作為基肥的化學肥料中，作為基肥施下，很有效果。

收穫前停止灌水

甘藍在收穫前，如土壤濕潤(灌水或降雨)，不但收穫前容易裂球和腐爛，收穫後也容易腐爛，而且運輸期間失重也較多，所以外銷的甘藍，在收穫前宜停止灌水，務必在土壤乾燥時收穫為要。

切口風乾後包裝

外銷甘藍，葉球收割後，應即在田野把球倒置，切口向上，經二十至三十分鐘，待切口風乾後再行包裝，這樣可以避免運輸期中切口腐爛。