


◎ 好消息

購買一臺耕耘機，只買一隻牛的價款，但可獲得二隻牛以上工作能力。

本公司最新出品與農鐵牛10型耕耘機為給普遍農友使用並明瞭該機性能起見特以空前未有之廉價大優待50臺現款為限

每臺附農具全套新臺幣壹萬元正



性 能	引擎四衝程 馬力九馬力 前進二段	犁耕每甲地15小時 耙平每甲地10小時 耗油量每加侖3.5小時
--------	------------------------	---------------------------------------


興農農機廠股份有限公司

臺中市大智路55號 電話：3272

裕 隆 牌

陸用柴油引擎

DE-6A型 7.5馬力 NT\$13,860.00



另有DE-4型 5馬力柴油引擎

均參加合作金庫實物貸款

請逕洽各地農會

裕隆汽車製造股份有限公司

臺北市信陽街十六號

水田

檸檬在水田栽培時，須注意排

可以

水良否和灌溉的設備；在排水不良和過於乾燥的土地栽培時，樹勢弱易呈老衰現象。

栽種檸檬嗎？

肥料以氮素三，磷酐一，鉀質一的比率配妥，散施行間後覆土。②大豆餅要浸水使完全醣酵後施於行間。③完熟豬糞尿也應施於行間。

七、八年檸檬株的施肥方法如下：①每株施肥量：硫酸銼二百五十公克，過磷酸鈣二百二十公克，硫酸鉀三百二十公克，魚餅九百二十公克，大豆餅五百五十公克，骨粉三百四十公克。單施化學肥料亦可，但在同時期施用多量化學肥料時，容易發生落花、落果現象。有機肥料的有效時間較長，同時還可增進果實色澤和香味。②每年分作正月，五月和十一月三次施用。（翁仁祿）

及抽苔、開花時各施一次。

②肥份不易流失的壤土或粘土一整地或移植前將堆肥全部施入作基肥，化學肥料三分之二或四分之三作基肥，其餘分三次作追肥施用，時間亦為幼苗二十公分時及抽苔、開花時各施一次。油菜從開花到成熟期間較長，所以最後一次追肥，應在開花期舉行才能促進油菜結果良好，提高產量。培土應在追肥直後舉行。

花到成熟期間較長，所以最後一次追肥，應在開花期舉行才能促進油菜結果良好，提高產量。培土應在追肥直後舉行。

注意除草灌漑和排水

除草工作在生長初期最為重要，因為移植直後的油菜植株小，株間有很多空閒，容易發生雜草，如不注意初期除草即易影響幼苗的生長。中耕也應在生育中視實際情形與除草追肥培土等工作合併舉行，以節省人工，普通在油菜生育初期舉行一二二次為宜。

油菜生育初期，土壤須要保持適當濕度，如果久旱不雨時，酌量灌漑，以促進生長。但是移植後的灌漑必須特別注意，即排水不良的地方，宜先灌

溉後移植，使田地不要過濕，以利油菜成活，排水工作在生育期後須注意，即油菜開花後所需水分較少，宜保持乾燥，如果土壤過濕，容易發生病害並延遲成熟。

番石榴要充份灌漑施肥！

番石榴（拔仔）結果期間土壤過分乾燥時，常引起落果，此外有些品種特別容易落果。

番石榴如管理適當，產量都很高，不需用藥物處理，增加結果量。在本省目前最好的品種是「東山月拔」，產量高，品質好。

開花前一個月多量施用氮肥時，可促進新梢的產生，因此可增加開花結果，如果管理適當，產量增加並不致嚴重影響植株發育。氮肥施用充分時，果色常較綠。

彰化縣田屋鄉蘇來農友詢問番石榴問題，本刊特請張振宙先生解答如上。