

# 劉庚與柳建平所問

## 肥料換谷答覆如下

(一)劉庚與農友詢問肥料分配及肥料換谷問題：糧食局對肥料時期極重視，均參照省內外肥料供應情形，盡量提早分配。本年二期肥料因部份來源供應發生困難，致影響配肥進度，乃就省產及進口數量大批發運中。至于農民繳納農會之稻谷水份含有率驗收標準，是否全省統一乙節，查臺灣省田賦征實驗收規則第三條第四項：「稻谷濕度以不超過十三%為合格」之規定，係屬全省統一之規定。

(二)柳建平農友詢問稻谷換肥問題，因內容含混未明，故請再來信列具事實，當可答覆。(糧食局)

## 橫山梨落葉早好或遲好？

【問】：橫山梨現在落葉，是否適合季節，有的會落葉，有的不會，那一種好？其原因何在？(南投縣國姓鄉長流村大坪陳光明)

【答】：橫山梨多種植於低海拔地帶，在較暖之地冬天落葉比較晚，稍冷之地此時已開始落葉。凡生長旺盛或在較濕之地，或較肥之土壤，落葉較遲。在乾燥之地，或生長不太旺盛者落葉較早。凡在每年收穫二次之地，其落葉較遲者好，如一年收穫一次之地，其早落葉者較佳。(朱長志)

## 栽培溫州蜜柑的問題

【問】：(一)栽植溫州蜜柑，有何特殊好處？

(二)栽植後若干期間可收成？

(三)新竹縣竹東鎮方面可否栽植？

(四)現市價每斤若干？

(五)溫州蜜柑是否可以大量栽植？(竹東鎮竹東里三民街二號梁廷標)

【答】：(一)溫州蜜柑，因具有剝皮容易，種子少，韌皮強韌，果肉鮮紅等特點，其適宜製造柑桔罐頭。

(二)由於品質的關係，需採用粗砂為砧木，栽後溫州蜜柑至四年後即可初結果。

(三)新竹縣竹東鎮一帶雖為栽培適地，但

須選擇海拔四百至六百公尺山地，才能採取無核果實。

(四)今年市價，每斤四至六元。

(五)將來是否可大量栽植等問題，因與將來的國民生活水準，罐頭工業及栽培面積多寡有關，目前尚無法確定。(翁仁祿)

## 枇杷宜栽較高山地

### 本省正常花期十一月

【問】：(一)據說田中枇杷開花期係在農曆十月左右，但我種植者(五年生)，現在八月每株都開花甚多，未知何故？

(二)目前則剝剪或是留至成熟時採果，對正季之產量有否影響？(南投縣埔里鎮過坑路二十二號陳枝榮)

【答】：(一)枇杷是一種帶果樹，在熱帶雖有栽培，但栽植地點多在二千公尺以上的山地。在低海拔栽培時，開花時期不定，且果實很快成熟，因此果實常細小，品質低劣，無經濟價值。在臺灣最好能在八百至一千公尺的山地栽培較宜。

(二)八月開的花很少結果，即使結果，將來果實也很細小，所以最好摘除，十一月才是正常的花期。(張振宙)



香蕉穗摘心

## 應注意二點

【問】：香蕉穗有人說摘心法分春夏秋冬，上午、下午實行是否有差別？其實之發育影響如何？(花蓮縣光復鄉中一路一八之六號鍾振祥)

【答】：香蕉因有春夏秋冬開花之分，因此收穫亦有春夏秋冬之別。故此摘心也隨季節不同而行之，惟摘心目的，係將花序末端的雄花摘除，以免消耗其本身養份，以增進每一果實的發育，但應注意下列二點：

(一)摘心應離最後一個果手較遠些，以免切口向上腐爛，影響鄰近果手。

(二)摘心時即行疏除果手，即春夏秋冬蕉留八至十果手，秋冬蕉留六至七果手。至於摘心的時間，依據學理與蕉株本身生理推測，上午下午對果實發育應無甚大差異。(王兆全)

## 迎接黃金時代的來臨

### 請趕快種植！

**蘆筍**——美麗華盛頓五〇九號。敝公司直接向美國 Burpee 公司訂購的蘆筍種子，原定去年十二月中旬可以進貨，但因原產地採收不及，未能如期送出，已延期入口，謹向農友們致歉，並繼續徵求預約，良機不再，預約請從速。

## 蕃茄

日本武藏野種苗園株式會社育成的超耐病性優良品種：寶冠一號、二號，夏冠一號、二號。它不但產量最高為任何品種所不及，而且果型果色非常美觀，品質更是極佳，最可貴的是土壤適應性極廣，除粘重土壤外，都適宜栽培。

其他適於外銷的長圓四季種甘藍，長圓六十日甘藍，坂田中早生甘藍以及各種一代雜交西瓜等不及細載，歡迎函詢選購。價目表函索即寄。

贈送蘆筍與瑞典蕪菁栽培法函索即寄

經銷 大 三 寶 易 有 限 公 司  
公司：高雄市中二路六二號  
電話：二一四八號  
行址：高雄市中二路三三號  
電話：二一四八號  
劃撥儲金：高字四〇二七七號

真正日本三笠會社出品

原封クロン現貨已到

農林廳農藥登記證農藥字第433號

ミカサ **クロン** 水和劑 (P.C.P.劑)

主要成分：ペンタクロロフエニールナトリウム鹽...90%

包 裝：每包500g裝 每箱40包入  
途：柑桔...瘡痂病、黑點病。  
葡萄...黑痘病。  
梨...黑斑病、黑星病。  
柿...黑星病、炭疽病。  
梅、桃...黑星病。

輸出元 三笠化學工業株式會社

日本 福岡市

經銷處 裕 隆 商 行

臺中市建國路167號 電話：4855號