溫州蜜柑比椪柑早結果

抗毒素病力較强於椪柑

【問】：㈠在豐原一帶種植溫州蜜柑，其結果率是否比椪柑低？

㈡溫州柑的抗病力，是否比椪柑强？（臺中縣神岡鄉岸裡村中山路廿四號呂繼宗）

【答】：㈠溫州蜜柑，由於需採用矮性砧木枳殼，故初結果年齡較早，但產量却略較同一年生的酸桔砧椪柑低。豐原一帶氣溫高，亦無高海拔地區，將來在平地或低海拔地區所產果實，可能含核率高而不適製罐。

㈡溫州蜜柑與椪柑的抗病性問題，依據栽培地區的環境及病原種類而異，不能一概而論，但對毒素病而言，溫州蜜柑的抗病性似較强。（翁仁祿）

尿素過磷酸鈣氰氮化鈣的混合及施用間隔問題

【問】：㈠我看到肥料手冊上的肥料混合表，過磷酸鈣與尿素混合後宜立即使用，但臺肥公司出版的肥料推銷人員手冊上，肥料混合圖是不可混合，請問何者較對？

㈡施氫氮化鈣後經多久才可施過磷酸鈣？

㈢用氫氮化鈣製的堆肥，經多久才可加入過磷酸鈣？（南投縣名間鄉萬丹村新丹巷一號賴藝展）

【答】：㈠尿素與過磷酸鈣原則上可混合，但須立刻施用，最好混合後施用時間愈短愈好，否者潮解厲害，要特別注意。爲了避免潮解及使用不便等，在量多時分開施用較宜。

㈡施氰氮化鈣經分解後才可施過磷酸鈣，一般約經三至十天。

㈢氰氮化鈣製的堆肥，最好施用時與過磷酸鈣一齊施用爲宜，不必加入堆肥內。（吳石生）

腰果葉枯病用波爾多大生防治

【問】：腰果葉上有斑點，有的部份變褐色漸擴及全葉及全株趨勢，附標本請問何病，如何防治。又該病是否與土壤有關？（臺南市樹林街四六號王柏如）

【答】：所寄標本是腰果葉枯病，可用四—三式「石灰波爾多液」或「大生二十二」四百倍稀釋液防治，噴藥時注意葉表葉背均勻噴到，每星期一次，繼續數次。又本病與土壤無關，病原菌係附於病葉上越冬傳染，應迅速去除病葉集中燒燬。（吳福壽）

初生乳牛的人工飼餵要點

【問】：㈠請問初生乳牛可否餵羊乳？

㈡飼法如何？

㈢飼乳期間多久？（瑞芳鎮吉慶里中央路五〇之一二號林騰輝）

【答】：㈠初生乳牛，生後一週內要吃母牛的初乳較好，因爲初乳中的脂肪礦物質蛋白質特多，具有輕瀉性，可排除胎糞並且還有自母體中得來的抗體，可增進犢牛抗病力，十週後可用羊乳，但羊乳不如牛乳品質好，故用牛乳較宜。

㈡犢牛生後一週內，用母牛初乳餵，每日三次，以手指枯乳放到牛口，漸漸引小牛的口到牛乳中，使其自己能吃，大約要二、三天的教飼，牛乳量在起初較少無妨，一週以後，牛乳量約爲犢牛體重的十分之一，但不超過此量爲佳，二、三週後可加入一點脫脂乳，約四、五週後可用半量脫脂乳，漸漸的代替至全部用脫脂乳。四、五星期後可放少許幼嫩的乾草及少量精飼料，任其自由舐食。

㈢乳牛的哺乳期間，以六個月最佳，有的在四個月後即斷乳，但往往發育不良，影響將來成長及生產能力。（黃立羣）



恭賀新春

水銀劑的霸王　水溶性 米穀樂淨（ミクロゾン）

已再入貨了敬請繼續賜顧爲幸

酵素劑 香蘭（コーラン）

新貨已到即請購用！

使用香蘭優點：十天可作成完熟堆肥、腐熟促進、肥効增進、糞尿速成優良肥料、老化土地之更新、病蟲害預防、果實加甜味蔬菜繁茂、提早收成增加產量。

◎蔬菜種子各貨均備，價格表函索即寄。

◎美國美麗華盛頓　加州五〇〇　蘆筍種子，開始預約歡迎訂購。

◎日本水仙、風信子、愛利斯、素蘭、白頭翁、鬱金香花球，現貨可供。

總代理　臺灣農產企業公司

經銷　臺灣農業資材公司

臺北市廸化街一段八十六號

電話：四四二五三・四二三六五九

劃撥儲金：一一七九九

家禽的救星　禽聖片 A.C.M



專治：鷄、火鷄、鴨、鵝、鴿子、小鳥等傳染性鼻炎、呼吸器病、腸炎、家禽傷寒、球蟲病、傳染性下痢、黴性肺炎、輸卵管炎、消化不良症。

包裝：每小包14片裝，每盒50包裝，500片裝，2000片裝。

（農畜衛可字第0336號）

最佳的獸藥

綜合素 Antimycin

專治特效：

猪肺疫、猪丹毒、傳染性腸炎、下痢、注射反應及其他細菌性化膿性諸疾患。

用法：筋肉注射用。

包裝：每瓶10cc裝，每小箱10瓶裝（農畜衛可字第0338號）



太平洋製藥有限公司

說明書備索：臺北市中山北路1段105巷90號　電話：47086