

怎樣栽培番石榴？

曾錫恩

番石榴在本省俗稱「拔仔」，無論園圃，山野或宅邊，到處都有生長，一年四季可結果，營養豐富，除供生食外，又可製造果汁，在外國又有製成果醬、果酒以及鹽漬等用途，是最大衆化的一種水果。

臺灣品種最優良

番石榴原產地是熱帶美洲，二百多年前臺灣即有栽培，一般是用種子繁殖，變種很多，大多是劣種，只有約四十年前，在彰化縣東山有一曹姓果農，以實生繁殖育成一個優良品種，就是現在栽培最普遍的中山月拔，品質優良聞名東南亞。除了中山月拔外，在臺灣還育成其他品種多種，同時也從外國引進數種優良品種。茲將主要品種簡介如下：

中山月拔

果實圓形，平均果重一一六公克，果面稍有瘤狀凸起，果肉白色，質細而脆，品質優良，產量高，主要產期爲春秋兩季，如果管理得當，一年四季皆可開花結果。

倒枝月拔

枝梢下垂，果實近似橢圓形，平均果重九三三克，果皮淡綠色，凸起不平，果肉色白而厚，種子少，肉質堅實，品質中等。

印度拔

果實洋梨形，稍扁，平均果重一〇八公克，果面呈疙瘩狀凸起，果肉白色，肉質稍粗，種子少，甜而脆，品質優良，四月開花，八月成熟，其他時期不易開花結果。

無核番石榴

即印度品種 Bedan，樹勢健強，葉片寬大，果實碩大成四稜形凸起或扁圓形，平均果重一一八公克，種子很少或沒有，石細胞多，肉質粗，甜而脆。

，但產量不豐，栽培不多。
除了上述四品種外，還有無名稱品種很多，更有從外國引進種子繁殖者，形式式，變異很多。

栽培容易又普遍

番石榴對土壤適應性很強，各種土質都可以栽培，但因番石榴是淺根性作物，應以排水良好的砂質壤土爲最適宜。株行距離爲四公尺，每株應挖半公尺四方洞穴一個，穴中施堆肥二十公斤，和園土拌勻將果苗定植在上面。凡經過嫁接的果苗，定植後可在當年生長的新梢上開花結果。實生苗不能保存原來品種的特性，栽植後二至三年始能開花結果。

整枝修剪最重要

定植後離地面二尺處剪定，使發生三個側芽爲主枝。等到主枝生長一尺半至二尺長時再行摘心，使發生六個側枝，這樣成爲一個杯狀形。以後視生長情形隨時摘心修剪；向上生長的徒長枝必須剪除，以保持完整的杯狀形。


番石榴的正常花期是四月，月拔類的品種，四季都可以開花結果，因此，栽培月拔可以由修剪和提早施肥灌水來控制開花結果。

剪定

枝梢留二至三節，將末梢剪除，使發生新梢，在新梢的第二至三節兩側着生花蕾，頂芽繼續生長，等到花朵開放後，在花架上方留二至三節剪斷，如果有少數沒有着生花蕾的新梢，如前述留二至三節再剪定，以促進再發生新梢。等到果實成熟後，結果枝上端的側芽繼續萌發新梢，這樣結果位置不致上升，樹形也不會生長太高。

摘葉

將枝梢的葉片摘除，兩側腋芽即萌發生長，同時着生花蕾，但不可施行過劇，否則



樹勢衰弱。

壓條

枝梢直立，便不容易萌發新梢着生花蕾，應將枝條壓下，在彎曲的位置的腋芽便萌發並着生花蕾。

灌溉施肥的要領

灌溉 栽植在旱畑或山坡地帶，乾旱時期應每半月灌溉一次，以免水份不足。栽植在水田的，應注意排水良好，否則果實產量雖高，但品質變劣。春季灌水可促進新梢提早萌發着生花蕾。

施肥

一般栽培者對施肥漫無標準，影響收量和品質很大。在本省未經試驗釐定標準以前，根據外國三要素的配合量，應該爲一一一一，每株每年應施混合肥料，一年生樹二百公克，二年生以後每年增加一百公克，至三年生以後每年施用一公斤已足，全年量肥料，分三月六月十月三次施放，或分三月六月九月十一月四次施放亦可。除化學肥料外，每年四五月間酌施堆肥一次，結果當更良好。

注意病蟲害防治

番石榴病蟲害最多的是煤煙病，介殼蟲、捲葉蟲和果實蠅，這些病蟲害都是很容易防治的。

● 五波爾多液防治。
介殼蟲類：以五〇％賽文五百倍液或二五％馬拉松乳劑五百倍液噴佈都有效。

捲葉蟲：以上述賽文、馬拉松或五〇％速滅松一千倍噴佈都有效。

果實蠅：果園中懸掛誘殺器，以甲基丁香油毒劑誘殺雄蟲，則雌蟲所產的卵便不能孵化，就沒有幼蟲可爲害果實。

除了上述數種病蟲害外，其他的病蟲害不多，以上述藥劑噴佈便有兼治的功効。