

農業信箱



橫山梨自然整枝法

【問】：我在新曆十二月種橫山梨三十株，現從離地面三寸起發新芽，變成整株都是新芽，請問要怎樣修剪？（臺北平溪鄉新寮村坎寮路一〇號吳龍堂）

【答】：橫山梨種植後並未說明用何種整枝方法，是用棚架式或自然形，如果是自然整枝則可於主幹保留五、六芽，其下部者可除去，此五、六芽當夏季生長過旺者，宜行摘心，過弱者宜用竹桿扶直些，大致使各枝對主幹成四十五度角即可。（朱長志）

「盧金剛」柑桔應多施肥

【問】：（一）一般設盧金剛在雨期易發生落葉現象，是否確實？栽培有無困難？（二）栽培後經過幾年可以留果，砂質土壤可以栽培嗎？（嘉義中埔鄉社口林德仔林六號羅壽春）

【答】：（一）「盧金剛」之特性如本刊第十三卷廿四期十四頁及第十四卷廿三期第十一頁所介紹，其樹勢強健，抗病力強，果皮薄、光滑帶鮮黃色，果實甜酸適度，香味強，結果率頗高，為優良甜橙系統之一。（二）所謂雨期易發生落葉現象等，若種於排水之低濕地，不但該品種如此，所有柑桔類均會發生爛根及落葉之現象。

（一）「盧金剛」之管理方法，如一般甜橙類，惟該品種性野，生長旺盛，產量豐富，故每年須施較多肥料，方能維持樹勢及防止隔年結果現象。適合肥沃砂壤土栽培。

（二）初結果年齡依栽培地及管理方法等而異，一般五、六年生時即可留一部份果實。（翁仁祿）

三年生水蜜桃

可以開始結果

【問】：（一）去年栽植的水蜜桃，今年已開花結桃了，早結桃是否有害，什麼時間結桃較為適當？（二）桃花開有紅白兩種白花是否水蜜桃？（三）冬季桃樹稍普遍枯萎，而呈現黑色病狀隆起，並流出一種黑色之液體，不知是什麼病症，應如何治療和預防？（四）栽植桃樹的參考何處有售？（臺中上谷崗臺發電廠田樹植）

【答】：（一）去年栽植之水蜜桃，今年雖已開花結桃，必須摘除，否則有碍樹之發育，影響將來之收量。一般可自種植後第三年開始結少量果實，最好在第四年樹已成形時結果為佳。（二）桃花一般均為粉紅色，只有山毛桃有白花者。（三）疫記述病狀，可能是桃折心蟲所害，因未見到標本不能十分確定。如係該蟲為害，最好噴巴拉松防治。（四）栽植桃樹之專書，現市面上尚少，僅有日文之可以買到。將來出版之園藝便覽，有專門栽植之一篇。此外其他果樹學上均有敘述，臺灣農家便覽亦可參考。（朱長志）

【問】：我種荔枝數百株已四年，因外行種植過淺，容易被風吹倒，現在培土八寸至尺半不等，有何等影響？（花蓮富里鄉富里林中山路一五四號林連彬）

荔枝培土太深極不利

【答】：荔枝苗都是用空中壓條法繁殖，初期根條很淺，必須選擇避風的地方種植，種植後還需設立支柱，用培土或深植的方法，並不能解決風的問題。培土太高或種植過深，將引起基幹腐爛，或在原來根之上部再發生第二次根，影響第一次根的發育，極為不利。（張根甫）

農藥成份標準 保證品質優良

現貨供應



蟲



牌

巴拉松乳劑

馬拉松乳劑

P M 乳劑

DDT 乳劑

安特靈乳劑

靈丹乳劑

地特靈乳劑

魚藤精乳劑 利我農乳劑

速克丹乳劑

經銷處

臺北：新豐農藥行
宜蘭：隆豐農藥行
桃園：豐年農藥行
苗栗：惠農藥行
南投：泰生藥行
臺中：進豐行
臺北市通化街一段249號
臺北市通化街一段231號
桃園縣中區鎮民路35號
苗栗縣竹南鎮八海路45號
南投縣南投鎮民族路113號
臺中市向上路一段2號之5

彰化：美豐行
彰化：德榮行
雲林：惠豐行
嘉義：年豐藥行
臺南：益源興藥材行
高雄：富興藥行
臺中縣縣治中正路337號
彰化市民生路166號
雲林縣虎尾鎮光復路48號之1
嘉義縣竹崎鄉六柱村3鄰199號
臺南市公園路173號
高雄市林森一路150號

屏東：光山化工行
花蓮：瑞成程子行
臺東：中農化工廠股份有限公司
總公司：臺北市南陽街21號2樓 電話：31660-28893
工廠：臺北縣景美鎮中正路317號 電話：932154