

農業信箱



水稻穗肥的效用

請注意施用時期

【問】：貴刊十五卷四期二十二頁高雄區水稻栽培注意事項中，早期施肥促進分蘖末：「水稻抽穗前二十五至二十七日（幼穗形成期）施用穗肥」又次頁合理施肥增進肥効末：「水稻的穗肥形成期（一期作約插植後六十五天二期作約四十五天）施用穗肥一次」。請問一期作的出穗期約八十天計算。後者是十五天，前者是二十五天，那一個是正確？（屏東內埔鄉與南四九號潘成榮）

【答】：高雄區水稻生育日數（自插秧至抽穗期）一期作約九十至九十五天，幼穗形成期在抽穗前二十五天計算，即等於插秧後六十五天左右。二期作生育日數約六十五至七十天，其幼穗形成期約在抽穗前二十五天計算，即等於插秧後四十五天左右，兩者符合。

【問】：函中提及一期作的抽穗期約八十天，是錯誤的，應為九十至九十五天，不過水稻生育日數，以品種之早晚熟，施肥量之多少，土壤性質之差異，氣溫之高低等，有時相差達十天左右，不是絕對不變。（謝英鏗）

若子可做稻田基肥

翻覆二週才可插秧

【問】：（一）新綠肥作物若子，一甲地有多少產量？

（二）春節前葉長不到一尺，近半月來天氣暖和有發育特快，請問若子對氣溫有敏感嗎？

（三）稻田遲插秧，如以若子做基肥，三要

素應如何配合？

（四）若子犁後多久才能插植水稻？

（五）若子生育日數多久？稻田如何留種？

（雲林縣二崙鄉定安村四四號周力民）

【答】：（一）若子綠肥每公頃最高收量為六萬至八萬公斤，一般為三萬至四萬公斤。

（二）若子生長初期慢，需待發芽後六十天，根部形成很多根瘤菌，且有溫暖氣候時，發育生長才特別迅速。

（三）每一萬公斤若子綠肥，有氮素四十餘公斤，約相當於硫酸銨肥料二百餘公斤。如砂質土壤，可施用若子綠肥二萬公斤左右，粘質土壤施用一萬至一萬五千公斤。燒肥料照原有標準量施用，而氮肥可減少一半，全作追肥施用。

（四）若子綠肥翻犁二週後，始可插秧。

（五）若子留種生育日數甚長，約需二百天以上，適宜旱田（如地）留種（張國勳）

臺農五七號甘藷

可在桃園區栽培

【問】：（一）臺農五七號甘藷在桃園、大溪、八德方面，可以栽培否？

（二）春作在三、四月間插植是否適當？

（三）每公頃須要多少甘藷苗？

（四）在北部何處可以買到諸苗？價錢如何？

【答】：（一）臺農五七號於民國四十七年，曾在桃園縣蘆竹鄉試作成績很好，故在大溪、八德二方面栽培似無問題。

（二）春作在三、四月間插植也適宜，但諸苗來源困難，最好三、四月自行育苗，六、七月間插植，可達到理想的產量。

（三）每公頃約需諸苗三萬至三萬三千株。

（四）若欲三、四月插植，在桃園縣內不易買到諸苗，只有向南部雲林縣一帶探詢。該諸苗本田諸苗，致價格無法估計（王俠）

好消息!! 豐年牌農藥



200萬元大贈獎

△凡購買豐年牌農藥

每滿七十五元者

即贈送豐年獎券一張。

△開獎日期請核對

八月十五日愛國獎券開獎之號碼。

興農化工股份有限公司

臺中縣大里鄉內新路 59 號

電話：5087. 5088. 5089 號

