


種菜銷外 良優

天津竹筒青白菜



李伯年

定植行間要寬大

竹筒青白菜植株高大，定植距離必須寬大，普通一、二公尺的畦面，除去畦溝，栽植二行，行距六公尺，株距也是六公尺，每分地除去四週畦溝，可栽二千四百株，如果過於密植，株型無法長大，結球情形就差，結果會影響產量。

糊仔栽培也適宜

竹筒青白菜組織堅實，幼苗抵抗能力強，適宜二期水稻糊仔栽培在水稻收穫前十五天，每隔三行水稻糊植於行間，株距仍為六公尺。水稻收穫後，立即整地培土施肥，使成單畦，撫育生長，產量和整地栽植並無高低。

多施肥料生長好

竹筒青白菜植株高大，如果培育得法，每株重可達十餘斤，因此需多施肥料。普通一分地，除基肥外，還應施追肥，硫酸銨六十斤，鉀肥和磷肥各十五公斤，分三次施入。苗高一公尺時，施全量五分之一，以後每隔十五天，施全量五分之一。

多行培土防倒伏

竹筒青白菜植株往上伸長，如果培土不厚，則易於倒伏，影響生育。因此自第一次施追肥後，株旁宜稍培土。第二次和第三次施追肥後，應大培土。

水份供應要充足

竹筒青白菜植株高大，發育旺盛，需要水份也多，如果不充分供給，會使生育停頓，因此必須時常注意。土壤中水份的含量。但每次灌水，萬勿使根部浸入水中，灌至半畦即應停止，再使其慢慢滲透至土面。

一分地十五萬斤

定植後一百至一百二十天可開始收穫。因為是晚生品種，延遲收穫仍可繼續生長，不會抽苔開花而影響品質。每分地的收量，十至十五萬斤不等。收穫的產品，如不即時出售，在低溫的冬季，放置數日亦不易腐爛。

竹筒青白菜除以新鮮蔬菜外銷外，也是加工製造冬菜的優良品種，各地農友如需要栽培，請向下列地點洽購種子！

- (1) 湖北省市德化街一段八十六號農產企業公司。
- (2) 高雄市建國三路二〇三號大豐種子行。
- (3) 嘉義市中正路四八二號清河種子行。



美國 Burpee 公司原封罐裝
美麗華盛頓五〇〇九號
蘆筍子

美國 Dresser 公司原封罐裝
加州五〇〇號蘆筍子
(月底到貨)

日本サカタ長岡交配 初秋甘藍
坂田交配 濱綠卷心白菜
臺灣總經理處

榮華種子行

三重市重新路一段72號
電話九七二七四九號
郵政劃撥儲金一三五七一號