



怎樣栽培夏季甘藍？

邱阿昌 陳漢

本省平地，由於夏季高溫多陣雨，一般蔬菜栽培較爲困難，以致夏季蔬菜比較缺乏。近年來，利用高冷地區生產夏季蔬菜，已有很大進展，但是由於運輸不便及土地限制，所以還不能大量供應。

甘藍在臺灣平地，是秋冬作的蔬菜，夏季栽培不易，但是如能選擇耐熱性品種，並提高栽培技術，成功希望是很大的。尤其在六、七、八月播種者，到九、十、十一月就可收穫，那時蔬菜仍很缺乏，所以價格很好。

選用耐熱早熟品種

本省過去夏季栽培品種，以「葉深」爲主，但因爲葉深生長期較長，六、七月播種者要到十一、十二月才可收穫，而且結球不整齊，結球不緊密，利用價值小。下列幾個品種比較早熟而且耐熱，較適宜夏季栽培。

- (1) 長岡交配六十日甘藍。
- (2) Top
- (3) New Top
- (4) 天理交配銀力。
- (5) 長岡交配初秋甘藍。
- (6) 坂田交配早生甘藍。
- (7) 高農交配四季種。

以上品種，在六至九月間均可播種，播種愈早，成熟愈早，價格愈高。

但栽培愈不容易。這些品種結球早，大約播種後九十天（定植後六十五天）即可收穫，所以球型較小，平均重量約一公斤左右，但結球整齊而緊密，適宜密植栽培，每分地可種四千株。

育苗期要防立枯病

夏季甘藍育苗，最大的阻礙是立枯病和幼苗發育不良，所以育苗前應將種子及苗床消毒；方法是以「收祿生」或「施美濃」乳劑一千倍液浸種並灌注苗床。

播種後一週即以擴疏法假植，假植苗床應多施堆肥、草木灰等，以保持苗床疏鬆。苗床上再覆稻草，以免大雨直接沖淨幼苗。

爲使苗床床溫降低，幼苗發育良好，可用紗布遮陰，並注意苗床濕度，勿使過乾，以免大雨時過濕而根部腐爛。

深耕·作高畦·移植

定植前深耕園地，施用較多堆肥，而且要深施，俾使根部發育良好。畦得高一

點，但土壤不宜過度細碎，以保土壤中空氣流通。播種後二十五至三十日即可移植，移植選擇傍晚，幼苗須帶土塊，以免夏日炎日晒枯，如不帶土移植，則移植後即應遮蔭。植後引水充分灌溉

畦面敷草畦溝灌水

定植後畦面蓋草一層，以減低土溫，並可保持土壤濕潤，同時可以防止軟腐病菌之感染。畦溝宜經常保持少量水份，如此可使根部習慣於濕潤

洋菇採收注意七點

- ① 晚間氣溫下降時噴水，噴水後注意通風，以免發生嚴重水傷。
- ② 採菇時噴水不可過度，用乾毛巾隨時擦乾工作者手指，以免污染菇冠。
- ③ 採菇後不使菇根與菇冠接觸，以免泥土污染菇冠，或迅速切除菇根，保持菇體清潔。菇根不可棄置菇舍附近，以免傳播蟲害。
- ④ 切菇必須應用不銹鋼刀，此項切菇刀，應由農會廉價供應。
- ⑤ 菇床覆土不可採用粘土，紅粘土尤不可用，以免污染菇冠，採菇後的補土必須細心填補，以免污染。
- ⑥ 切根後之鮮菇，應盛於硬質容器內，容器材料不可用鐵質。容器高度每層不可超過十英吋，各層要有支架架開，以免鮮菇擠壓變色。
- ⑦ 盛菇容器上覆蓋濕布，以免運送途中污染，同時防止因日晒及氧化之變色。（李秀）

農友們!! 種植夏時甘藍請用絕不腐爛，耐暑性最強食味最優市場價格最高最短期間可收穫的
●超極早生脫管甘藍(トツア甘藍) 每台兩九〇元

(請參考六月五日聯合版週刊有詳細介紹)
胡蘿蔔同是名爲黑田五寸人參 但要種植真正紅心種 請一定指明 日本八江農藝出品的 紅心新黑田五寸人參

才不會失望 此種在全省有名種苗店均有出售 直接函購 每磅連郵費九十五元正

(敝公司負責保證此品切開全部紅心無美國種及其他日本牌子切開有黃心情形)

●美國原封蜜罐種子八月份可再入貨 歡迎預定購者請向直接進口商採購才不致有誤購省產種向敝公司採購之貨如發現臺灣種負責賠償種子款二十倍

●正金門結頭菜每磅罐裝九十元 作罐頭用グリーンピース(豌豆仁) 正美國產，現貨供應

●最理想農藥簡便計量器(水和劑、粉劑、乳劑重量倍數均可使用) KOSPER

每支壹拾元(運費二元)

●美國青皮紫皮瑞典燕膏現貨供應

●美國日本秋時蔬菜種子全部入貨

●最新價格表函索即寄

臺北市迪化街一段86號 郵政劃撥臺灣二二七九九號