

## 防治蘆筍金針蟲

用「阿特靈」或「飛佈達」

【問】：最近在蘆筍園發見有一種如標本的害蟲，潛在土壤中近根部處。請問：

(一)此種正名及日名叫什麼？

(二)是吸收根部營養分或直接咬斷根部？

(三)可用何種藥劑防治？用「ヘプタ」可以嗎？怎樣施用？(大甲鎮文武里德興路三

六號賣朝鐘)

【答】：(一)所發來害蟲標本是金針蟲，俗稱鐵線蟲，就是叩頭蟲(撞米龜)的幼蟲，日名叫「ハリガネムシ」。

(二)金針蟲多潛伏在土中蛀食作物地下部，不是吸收養分。

(三)此蟲除食害蘆筍根部外，常會鑽入地下莖，尤其嫩莖中蛀食。

(四)防治金針蟲，應該在種植蘆筍前，施用土壤殺蟲劑如阿特靈或飛布達等，並拌入土中才有良好效力，已種蘆筍之地如發現有金針蟲為害，也可再施藥防治，每分地用四分之一磅金針蟲可濕性粉一公斤，或一、五分飛布達四、五公斤，平均撒施植株下，並立即用鋤頭入拌土中四、五寸深，可防治之。(張良傳)

## 北部種植柑金柑

### 株距依種類而異

【問】：(一)晚生橙類如晚命西亞，在北部之臺北近郊或近宜蘭地方，可否大量栽培，或栽培何類為佳？

(二)柑橘種植距離多少最適？近來有人說密植留果至形擁擠時再行間伐，不知其法可行否有缺點嗎？(基隆市中正路一〇八之二號陳玉麟)

【答】：(一)晚生橙類如晚命西亞等，在臺北或宜蘭附近不適栽培。由於本省北部開花及結果初期雨水過多，故落花與落果現象嚴重，加之颱風後潰瘍病之發生頗嚴重，不該大面積種植。北部地區仍栽培柑橘與金柑為宜。

(二)柑橘之株距仍依地力、山坡斜度及品

種等而異。目前農林廳農復會之推廣標準

，柚子為二十四×二十四台尺。甜橙為二十二×二十二台尺。椪柑、桶柑為二十×二十台尺。檸檬為十八×十八台尺。金柑為十五×十五台尺。如地力較瘦或根盤等弱勢砧木，植距可稍縮小。

計劃密植法僅限於平坦且富有人工之地區實行。計劃密植栽培法請參照本刊十四卷二十期十一頁。(翁仁祿)

## 鞣製兔毛皮幾個問題

【問】：(一)鞣製兔毛皮水漬時容易發臭，毛常脫落，請問要加什麼藥品，或有其他較好方法？

(二)利裏的工作真難做，請問用什麼工具或有較好的方法？

(三)兔仔在飼養中，易使毛色不潔白，請問用漂白粉漂洗，是否可以清白，或用什麼藥品處理？

(四)鞣製好的毛皮，肉面變黃色，請問是否鞣製不適當？有什麼方法補救使肉面白色？

(五)苗栗免裡鎮新復里九一號莊玉松)

【答】：(一)水漬毛皮時主要的是經常換水，否則會臭，不用什麼藥品。

(二)利裏用刀口不銳的刀，要仔細的做，一塊宋板上，用刀輕刮。

(三)兔子在飼養時應注意清潔，不可有糞尿污染了毛，否則不易洗滌，這種不白的毛皮價値低。

(四)毛皮內面變黃是鞣製不完全所致，可

能鞣製的一階段時間不够，鞣製後磨底，該

沒有什麼好方法，多做就易了，平平的放在

一塊宋板上，用刀輕刮。

(五)兔子在飼養時應注意清潔，不可有糞

尿污染了毛，否則不易洗滌，這種不白的毛皮價値低。

【答】：(一)水漬毛皮時主要的是經常換

水，否則會臭，不用什麼藥品。

## 需要肥料水份充足

【商】：請問東部所栽的中山月拔，會使用充足的化學肥料及自給肥料，且曾規定

，為何果實總不如西部的大，是何原因？是不該大面積種植。北部地區仍栽培柑橘與金柑為宜。

土壤欠某種微量元素或氣候的關係？(花蓮吉安鄉化仁村化仁一八〇號廖萬沛)

【答】：(一)本省一千公尺以下的地區栽培

最信用，最可靠，最標準  
外銷國產品，臺灣省合作


，合約採用可獲分期付款。  
金庫及臺糖公司特地推薦  
。(北部顧客請連絡臺北

營業處)

## 永興牌機動發油機



興



專門製造發動機  
抽水機  
馬 3-4-6-8-10.5  
馬 6-8-13  
省油耐用  
物美價廉

※ 中日技術合作，嚴格品質管制，榮譽出品。  
※ 中央標準局註冊商標，申請①核檢在案。  
※ 臺灣省檢驗局，性能檢驗報告確到國際標準。

司公限有份股機造興永

(TEL 2171) 號 111 路 愛仁市義嘉公司  
(TEL 53371) 號 326 路 西安長市北臺

總  
司  
公  
營  
北  
臺

享譽已久  
公認的效力

福利來

Furella  
‘フレラ’

新貨已到  
即請購用



說明書備索

各地均售

飼料行房

大藥物廠

總代理：英商卜內門化學有限公司  
經銷處：國際畜藥物廠  
臺北市長安東路一段三九號