



樹果

促進梨樹開花結果

可用枝條環狀剝皮

【問】：貴刊十二卷五期農業信箱，顧明揚先生所問：「梨樹開花不結果」等，解答為：「不結果樹，可在秋冬之間，將當年生枝條距先端一公尺處，環狀剝皮一公分左右寬，可促進結果」，請問：限當年生枝條行環狀剝皮，以促進結果，其理由為何？（臺中東勢鎮廣興里中興街西新巷一〇三號張叔林）

【答】：梨的花芽着生位置，均在新枝條的先端部，當年生的枝條行環狀剝皮，可貯蓄當年生枝條內之碳水化合物，才能促進花芽分化。二年生以上大枝條行環狀剝皮時，除易損害樹勢以外，對新枝條之充實上無多大益處。（翁仁祿）

腰果適宜直播

果實用途頗廣

【問】：（一）腰果在臺東卑南鄉利嘉段山坡地，是否適宜種植。地勢約海拔三百公尺以下。直播何時播種最好？

（二）自種植到收穫需要幾年？

（三）種植後是否需要嫁接？

（四）山坡地以三角形種植。其株行距應多少？每甲地種幾株？

（五）直播每甲地需種子多少？每公升有多少粒？每次播幾粒？發芽率有幾成？

（六）施用肥料每年每畝需鉀多少？有那些病蟲害？防治方法如何？

（七）開花期幾月？何時能收穫？對颱風有無影響？

（八）收穫時以鮮果實為主抑或乾果仁為主？果實之加工方法如何？

（九）樹齡能維持多久？其正常生產有幾年？每株平均能收穫果實多少？

（十）大規模種植有無經濟價值？將來銷售有無困難？（臺東縣卑南鄉太平村二〇八之十號）

【答】：（一）介壽果（腰果），適於排水良好的土壤栽培，臺灣一般黃土地帶都可栽培。臺東卑南一帶海拔三百公尺以下山坡地亦可栽培。

（二）播種時期五月六月，直播苗三年開始結果。

（三）以直播為宜，移植或嫁接均困難。四株行距約五×六公尺，正三角形種植時每公頃約五百株。

（四）種子發芽率相當高，直播時每穴播種二枚，發芽後拔去一株，每公頃約有一千粒種子。

（五）病蟲害較少。肥料一年施二次，都在除草後施用，幼苗配合肥料以氮二磷一鉀一的比例施用。開始結果後，可以用氮二磷一鉀二比例施用之。

（六）花期為四月中下旬，收穫期為六七月，可避免大部份颱風為害。

（七）腰果之花托與堅果，都可供食用。花托可以生食，也可供釀造，釀造時花托破碎之，取果汁拌砂糖，加三倍六十度熱水入罐，再於每十五—廿公升液體加四分之一碗酵母，放置七—十一日，取其澄清液，加溫至五十一—六十度，經過一個月成酒，可儲存一年。

（八）生果切片混和砂糖，風味良好，如用以製造果醬或甜食甚爽快，可作洋酒或冰淇淋之調味品。子仁部份可加油炒食或作糖果原料。

（九）本省未有介壽果之老株，因此無法知道其壽命，惟據記載：「木果性強健，於印度南部沿海砂地，有成野生狀態者……等語」。

大信牌農藥

應各界農民備用，產品項目大量增加！

水稻，蔬菜
豆類，果樹

等用



品質優良
成分準確
藥效迅速

殺菌劑

（紋枯病用）

威力新

液劑

農藥登記證 802 號

（稻熱病用）

美稻農

乳劑

農藥登記證 436 號

殺蟲劑

殺可新特新新青鹽

蟲藥全級

實殺蟲松多松靈丹

乳乳乳乳乳乳乳乳

劑劑劑劑劑劑劑劑

農藥登記證 498 號

農藥登記證 494 號

農藥登記證 755 號

農藥登記證 281 號

農藥登記證 416 號

農藥登記證 415 號

農藥登記證 562 號

農藥登記證 501 號

大信農化工廠有限公司

台北市天水路十五號
TEL 44309 · 50945