

臺灣亞麻 興衰史

文圖/陳環斌

亞麻學名 *Linum usitatissimum*，英文名 flax，臺灣栽培亞麻紀錄僅 50 餘年，最早由日本於 1920 年引進試種，並在日據時期 1942 年起在新竹、臺中等地推廣於冬季裡作栽培，推廣面積 2,755 公頃，直到 1944 年面積增加 10,435 公頃，光復初期由於沒有種原供給，生產面積停頓。民國 39 年後漸漸恢復生產，到了 54 年生產面積增加至 5,524 公頃，為光復後最高紀錄，其後近十年亞麻栽培面積約在 2,500-4,031 公頃之間，民國 65 年栽培面積由 3,161 公頃，逐漸下降至民國 70 年栽培面積僅 290 公頃。在民國 70 年以前推廣期間種

植亞麻以採收纖維為主，種子為輔，並由臺灣工礦公司烏日製麻廠契作栽培，契作鄉鎮分布於臺中市南屯、西屯、霧峰、大雅、潭子、后里、外埔、清水等地區，彰化縣則有芬園、大村、溪州、埤頭、竹塘、二林、大城、芳苑、鹿港等鄉鎮，而少數分布於雲林縣崙背、水林等地。整體而言，亞麻栽培面積 87% 集中彰化，10% 分布在臺中，零星分散於南投與雲林等地。民國 71 年起，臺灣工礦公司停止製麻收購相關業務，至今 (106 年) 無亞麻種植面積。



臺灣亞麻栽培面積統計