



108 年 8 月公告增修藥劑使用方法於山茶科作物簡訊

文 / 楊小瑩*、林秀樂、林儒宏

(* 電話：049-2753960 轉 611)

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 108 年 8 月 30 日公告增修「三氟得克利」等 31 種農藥之使用方法與範圍（防檢三字第 1081489465 號），本次新增核准登記使用農藥之作物範圍包括茶、油茶及山茶等，整理如表一。除新增核准登記使用外，本次公告亦刪除多支尚未訂定農藥殘留容許量之農藥使用範圍，包含 15.80% 因得克乳劑、18.02% 固殺草溶液及 13.50% 固殺草溶液在茶園的使用，提醒農友特別注意這 3 種藥劑。

表一、108 年 8 月公告新增使用於山茶科作物之藥劑使用方法整理

農藥名稱	作物名稱	病蟲名稱	稀釋倍數	使用時期	安全採收期	注意事項
10.00% 氟尼胺水分散性粒劑	茶	椿象類	3,000	害蟲發生時開始施藥	21	適用於茶葉
		椿象類	3,000	害蟲發生時開始施藥	21	適用於茶籽
	油茶	椿象類	3,000	害蟲發生時開始施藥	21	-
	山茶	椿象類	3,000	害蟲發生時開始施藥	-	-
18.20% 益達胺水懸劑	茶	葉蟬類	6,000	發芽初期害蟲發生時開始施藥	12	適用於茶葉
		葉蟬類	6,000	發芽初期害蟲發生時開始施藥	12	適用於茶籽
		柑桔刺粉蝨	4,000	害蟲發生時施藥 1 次	12	-
		小綠葉蟬	6,000	萌芽初期害蟲發生時開始施藥	12	-
		小黃薊馬	4,000	萌芽初期害蟲發生時開始施藥	12	-
	油茶	葉蟬類	6,000	發芽初期害蟲發生時開始施藥	12	-
	山茶	葉蟬類	6,000	發芽初期害蟲發生時開始施藥	-	-



農藥名稱	作物名稱	病蟲名稱	稀釋倍數	使用時期	安全採收期	注意事項
28.80% 益達胺溶液	茶	葉蟬類	9,000	發芽初期害蟲發生時開始施藥	12	適用於茶葉
		葉蟬類	9,000	發芽初期害蟲發生時開始施藥	12	適用於茶籽
		柑桔刺粉蝨	6,000	害蟲發生時施藥 1 次	12	-
28.80% 益達胺溶液	茶	小黃薊馬	6,000	萌芽初期害蟲發生時開始施藥	12	-
	油茶	葉蟬類	9,000	發芽初期害蟲發生時開始施藥	12	-
	山茶	葉蟬類	9,000	發芽初期害蟲發生時開始施藥	-	-
9.60% 益達胺水懸劑	茶	葉蟬類	3,000	發芽初期害蟲發生時開始施藥	12	適用於茶葉
		葉蟬類	3,000	發芽初期害蟲發生時開始施藥	12	適用於茶籽
	油茶	葉蟬類	3,000	發芽初期害蟲發生時開始施藥	12	-
	山茶	葉蟬類	3,000	發芽初期害蟲發生時開始施藥	-	-
9.60% 益達胺溶液	茶	葉蟬類	3,000	發芽初期害蟲發生時開始施藥	12	適用於茶葉
		葉蟬類	3,000	發芽初期害蟲發生時開始施藥	12	適用於茶籽
	油茶	葉蟬類	3,000	發芽初期害蟲發生時開始施藥	12	-
	山茶	葉蟬類	3,000	發芽初期害蟲發生時開始施藥	-	-
11.80% 護汰芬水懸劑	茶	茶餅病	2,000	病害發生初期開始施藥	21	適用於茶籽
	油茶	茶餅病	2,000	病害發生初期開始施藥	21	-
	山茶	茶餅病	2,000	病害發生初期開始施藥	-	-
15.00% 易胺座可溼性粉劑	茶	茶餅病	2,000	病害發生初期開始施藥	9	適用於茶籽
	油茶	茶餅病	2,000	病害發生初期開始施藥	9	-
	山茶	茶餅病	2,000	病害發生初期開始施藥	-	-