

- 一、驗土pH值為4.8，請問每分地要施用多少的苦土石灰來調整土壤pH值？

答：建議每分地施用120～180公斤苦土石灰。為不使土壤反應過於激烈，不宜一次就調到所需要的pH值，應逐年逐步改良，一般作物pH值6即可。

- 二、硼可以預防裂果，如果基肥有使用硼砂2公斤/每分地，後續開花結果後，還有需要添加水硼3,000倍葉面施肥嗎？

答：要依品種而定，如果是薄皮品種，仍需葉面噴施水硼，然噴施頻率可延長7～10天一次，再看果實果皮厚、薄做調整。

- 三、市面上蘇力菌有分「庫斯」和「鯨澤」兩種，若要防治斜紋夜盜和夜蛾，請問「庫斯」蘇力菌對夜蛾類的防治效果好嗎？

答：兩者其實差異不大，若您有使用覺得不錯的廠牌，持續使用即可。因有些蘇力菌的菌株殺蟲範圍較廣，

可殺斜紋夜盜或甜菜夜蛾，但效果不一，還是要看商品的標示，不同的商品來自不同的菌株，每樣商品都會在瓶身的標籤標示主要防治對象有哪些。若沒有標示防治對象種類，一般而言，效果並不理想。

- 四、番茄田間「瘋癱」有的是葉梢紫色，曾將「瘋癱」上異樣果粒摘除，新的果粒並沒發現有瘋癱現象，請問是何原因？

答：1. 番茄植株出現葉片捲曲、黃化、皺縮及節間縮短等症狀，即為植株感染病毒病害所致，嚴重者停止生長，花器發育不良，導致不

結果或果品不佳。番茄植株感染病毒後，無法以藥劑進行治療。所以，應將發病植株立即拔除並移出田區，同時加強銀葉粉蝨、薊馬與蚜蟲等媒介昆蟲的防治，避免病害持續傳播蔓延。

2. 因未看到罹病植株實體，無法正確判斷，是否就是感染病毒病（瘋癱）。建議將罹病植株照相，檔案傳送至本場為民服務信箱（service@mail.kdais.gov.tw）或將植體寄送改良場診斷。若有相關作物病蟲害診斷防治問題，歡迎來電(08) 738-9060 詢問。

