

荔枝椿象不可怕 精準防治搶先機

文・圖／陳明吟



荔枝椿象成蟲冬季喜歡躲藏於葉背間



荔枝花開時易吸引荔枝椿象前來取食

冷冷的冬季低溫會消耗荔枝椿象體內的養分，所以當荔枝花芽萌發時，很容易引來荔枝椿象群聚於花穗吸食汁液以獲取營養，嚴重影響荔枝結果量。目前高屏地區荔枝花芽悄悄冒出，荔枝椿象也蠢蠢欲動，為降低椿象密度、防範荔枝花芽受害，此刻正是化學防治的最佳時期。本場籲請農友集中於盛花期前一起進行區域共同防治，以提升防治成效並避免蜜蜂受害。

荔枝椿象以性未成熟的成蟲越冬，待來年氣候溫暖時，越冬成蟲開始活動在荔枝花穗上吸食危害，於性成熟後開始交尾產卵，族群密度高時會嚴重影響荔枝產量與品質。由於成蟲越冬後會大量消耗體內脂肪，對藥劑的敏感度較高，加上氣候冷涼，行動較為遲緩，故荔枝盛花期前為防治的關鍵時機。另外，成蟲受干擾時會分泌臭液，如果觸及人體皮膚或眼睛，會造成灼傷般的潰爛，農友應多加留意。

為達事半功倍之效，本場與防檢局在現地會勘後，已訂定高屏地區荔枝的荔枝椿象化學共同防治期程為1月17日至2月18日。農民可於荔枝盛花前選擇核准使用於荔枝椿象的防治藥劑，例如2.8%賽洛寧水懸劑2,000倍、20%亞滅培水溶性粉劑4,000倍或48.34%丁基加保扶水基乳劑1,000倍等藥劑，施藥時加強葉背與枝條縫隙的噴施，以達最佳防治效果。農友在鑑定或防治上如有進一步問題，歡迎逕洽本場，技術人員將竭誠為農友服務。

f 動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵 LINE @baphiq 廣告

111年

荔枝椿象 化學共同防治期

把握越冬後防治黃金時間



高屏
地區

荔枝：1/17 - 2/18

龍眼：2/07 - 3/04

※各地區共同防治期程將陸續公布



- 配合期程進行區域化學共同防治
- 選用公告核准藥劑
- 開花期停止施藥，避免誤傷蜜蜂

※如有防治問題可向各區改良場洽詢

行政院農業委員會農糧署

不囤積不搶購、肥料充分供應農需