



時值芒果開花著果期

請農友慎防病蟲害

目前芒果正值開花著果期，白粉病、炭疽病、細菌性黑斑病、芒果螟蛾、小黃薊馬、臺灣花薊馬與芒果葉蟬等為該時期常見病蟲害。本場籲請農友注意氣候變化，於病蟲害發生初期即時防範，以確保芒果穩定生產及果實品質。值得注意的是，薊馬類害蟲目前因氣候乾燥，密度已有上升趨勢，請農友務必留意防範。

小黃薊馬喜好躲藏在芒果花穗、幼果果蒂及新葉葉脈附近危害，可造成嫩葉焦枯、花穗受損及幼果表皮褐化結痂。臺灣花薊馬則主要在芒果花穗上危害，造成花穗乾枯，初期不易察覺，待被害徵狀出現時，再防治則為時已晚。本場近來調查發現，危害芒果的薊馬類害蟲密度已有升高趨勢，籲請農友留意田間密度，即時防範。另外，本場亦特別呼籲，於陰雨高濕時，風勢較大的地區，應特別留意預防細菌性黑斑病，以避免幼果期受害，而大幅降低商品價值。

為掌握病蟲害的黃金防治期，農友應加強田間衛生管理，落實清園工作，並於花期及幼果期適時施藥防治，平時可懸掛黏板監測蟲數，即時掌握防治時機。農友如須執行化學防治時，請參考農藥資訊服務網(<https://pesticide.baphiq.gov.tw/information/>)及植物保護資訊系統(<https://otserv2.tactri.gov.tw/PPM/>)的核准用藥，且務必依照核准的稀釋倍數施用，以降低產生抗藥性風險。另有關輪日、韓芒果病蟲害防治用農藥基準，可參考農業藥物毒物試驗所的外銷農產品用藥基準(<https://reurl.cc/zMA3la>)。農友在芒果病蟲害鑑定或防治上如有疑問，請直接與本場聯繫，技術人員將竭誠提供服務。



文・圖／陳明昭

- Ⓐ 葉蟬危害分泌蜜露，造成花穗煤煙病。
- Ⓑ 芒果炭疽病(點狀紅斑處)及黑斑病(黑斑流膠處)危害小果



- Ⓒ 小黃薊馬危害幼果
- Ⓓ 臺灣花薊馬危害刺吸造成花穗乾枯

