

各區改良場轄內主要蜜粉源作物花期病蟲害發生及其防治藥劑基本資料								
縣市	鄉鎮市區	作物種類	花期	連續採收	病蟲害類別	病蟲害發生時期及生態	為害作物部位	防治時機
新北市	石碇區、坪林區、三峽區	茶樹	9~11月	否	茶避債蛾類	全年，2-4；6-7；9-10月大量成蟲	細枝條、葉片	葉片出現啃/蠶食痕跡
新北市	石碇區、坪林區、三峽區	茶樹	9~11月	否	茶尺蠖蛾類	3-5；11-12月危害較重	葉片	葉片出現啃/蠶食痕跡
新北市	石碇區、坪林區、三峽區	茶樹	9~11月	否	茶捲葉蛾類	全年，一年6-7世代	葉片	葉片因幼蟲吐絲而捲葉；2~3葉片黏著而有淡褐色食痕。
新北市	八里區	柑橘類	3~4月	否	薊馬類	周年發生，以乾旱季節發生最多。於柑桔花後轉移至幼果時銼吸果實表皮細胞。	春梢、花、幼果	柑橘開花期前後
桃園市	中壢區、平鎮區、龍潭區、楊梅區、新屋區、觀音區、桃園區、龜山區、八德區、大溪區、復興區、大園區、蘆竹	茶樹	10~12月	否	茶捲葉蛾類	全年，一年6-7世代	葉片	葉片因幼蟲吐絲而捲葉；2~3葉片黏著而有淡褐色食痕。
桃園市	中壢區、平鎮區、龍潭區、楊梅區、新屋區、觀音區、桃園區、龜山區、八德區、大溪區、復興區、大園區、蘆竹	茶樹	10~12月	否	茶小綠葉蟬	全年，一年14世代	嫩芽葉	危害初期，危害嫩芽葉造成黃綠色
桃園市	楊梅區	梨	1~2月	否	蚜蟲類	接穗後若蟲向接穗部位遷移危害，或危害嫩梢及花器。	接穗部、嫩梢、花器	接穗後、梨樹開花期前
新竹市	香山區	荔枝	3~4月	否	荔枝椿象類	全年，4~10月大量若蟲。	枝梢、花穗。	椿象若蟲期，約2~3月至荔枝花期前。
新竹縣	竹北市、湖口鄉、新豐鄉、新埔鎮、關西鎮、芎林鄉、寶山鄉、竹東鎮、五峰鄉、橫山鄉、尖石鄉、北埔鄉、峨眉	茶樹	10~12月	否	茶捲葉蛾類	全年，一年6-7世代	葉片	葉片因幼蟲吐絲而捲葉；2~3葉片黏著而有淡褐色食痕。
新竹縣	竹北市、湖口鄉、新豐鄉、新埔鎮、關西鎮、芎林鄉、寶山鄉、竹東鎮、五峰鄉、橫山鄉、尖石鄉、北埔鄉、峨眉	茶樹	10~12月	否	茶小綠葉蟬	全年，一年14世代	嫩芽葉	危害初期，危害嫩芽葉造成黃綠色
新竹縣	寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、橫山鄉、芎林鄉、關西鎮、新埔鎮	柑橘類	3~4月	否	薊馬類	周年發生，以乾旱季節發生最多。於柑桔花後轉移至幼果時銼吸果實表皮細胞。	春梢、花、幼果	柑橘開花期前後
新竹縣	關西鎮	草莓	12~翌年3月	是	薊馬類	溫暖乾燥氣候	嫩莖、嫩葉、花器	育苗期至開花前
新竹縣	新埔鎮	梨	1~2月	否	蚜蟲類	接穗後若蟲向接穗部位遷移危害，或危害嫩梢及花器。	接穗部、嫩梢、花器	接穗後、梨樹開花期前
苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭	梨	全年	是	葉蛾類	全年，乾燥溫暖氣候。	新梢、嫩葉。	梨生長期
苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭	梨	全年	是	蚜蟲類	全年，乾燥溫暖氣候。	新梢、嫩葉。	梨生長期

苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮	梨	全年	是	薊馬類	全年，乾燥溫暖氣候。	新梢、嫩葉、果實。	梨生長期
苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮	梨	全年	是	炭疽病	全年，高溫多濕氣候。	新梢、嫩葉、果實。	梨生長期
苗栗縣	西湖鄉	龍眼	4~5月	否	龍眼椿象類	全年，4~10月大量若蟲。	枝梢、花穗。	椿象若蟲期，約2~3月至龍眼花期前。
苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮	柑橘類	3~4月	是	薊馬類	全年，乾燥溫暖氣候。	新梢、嫩葉、果實。	柑桔開花期，至幼果期
苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮	柑橘類	3~12月	是	炭疽病	高溫多濕氣候。	新梢、嫩葉、果實。	柑桔開花期，幼果期至採收期
苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮	水稻	5~6月	否	水稻飛蟲類	全年，5~11月大量若蟲。	花穗。	水稻孕穗期至收割前
苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮	水稻	9~10月	否	水稻飛蟲類	全年，5~11月大量若蟲。	花穗。	水稻孕穗期至收割前
苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮	水稻	5~6月	否	水稻螟蛾類	全年，4~11月大量若蟲。	全株。	水稻分蘗期至收割前
苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮	水稻	9~10月	否	水稻螟蛾類	全年，4~11月大量若蟲。	全株。	水稻分蘗期至收割前
苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮	西瓜	5~6月	是	瓜類蚜蟲類	全年，乾燥溫暖氣候。	新梢、嫩葉。	西瓜生育初期至採收前，約5~9月。

苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮	西瓜	5~6月	是	瓜類露菌病	全年，高溫多濕氣候。	新梢、嫩葉。	西瓜生育初期至採收前，約5~9月。
苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮	西瓜	5~6月	是	瓜類炭疽病	全年，高溫多濕氣候。	新梢、嫩葉、果實。	西瓜生育初期至採收前，約5~9月。
苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮	西瓜	5~6月	是	瓜類白粉病	全年，乾燥溫暖氣候。	新梢、嫩葉、果實。	西瓜生育初期至採收前，約5~9月。
苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮	西瓜	9~10月	是	瓜類蚜蟲類	全年，乾燥溫暖氣候。	新梢、嫩葉。	西瓜生育初期至採收前，約5~9月。
苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮	西瓜	9~10月	是	瓜類露菌病	全年，高溫多濕氣候。	新梢、嫩葉。	西瓜生育初期至採收前，約5~9月。
苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮	西瓜	9~10月	是	瓜類炭疽病	全年，高溫多濕氣候。	新梢、嫩葉、果實。	西瓜生育初期至採收前，約5~9月。
苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮	西瓜	9~10月	是	瓜類白粉病	全年，乾燥溫暖氣候。	新梢、嫩葉、果實。	西瓜生育初期至採收前，約5~9月。
苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮	西瓜	9~10月	是	瓜類炭疽病	全年，高溫多濕氣候。	新梢、嫩葉、果實。	西瓜生育初期至採收前，約5~9月。
苗栗縣	大湖鄉	胡瓜	7~9月	是	瓜類蚜蟲類	全年，乾燥溫暖氣候。	新梢、嫩葉。	胡瓜生育初期至採收前，約6~9月。
苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮	茶樹	10~12月	否	茶捲葉蛾類	全年，一年6-7世代	葉片	葉片因幼蟲吐絲而捲葉；2~3葉片黏著而有淡褐色食痕。

苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮	茶樹	10~12月	否	茶小綠葉蟬	全年，一年14世代	嫩芽葉	危害初期，危害嫩芽葉造成黃綠色
苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮	草莓	3~12月	是	炭疽病	高溫多濕氣候。	新梢、嫩葉。	草莓幼株期開始至採收期
苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮	草莓	3~12月	是	薊馬類	全年，乾燥溫暖氣候。	新梢、嫩葉、果實。	草莓幼株期開始至採收期
苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮	草莓	3~12月	是	葉蟬類	全年，乾燥溫暖氣候。	新梢、嫩葉。	草莓幼株期開始至採收期
苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮	草莓	3~12月	是	蚜蟲類	全年，乾燥溫暖氣候。	新梢、嫩葉。	草莓幼株期開始至採收期
苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮	草莓	3~12月	是	葉蛾類	全年，乾燥溫暖氣候。	新梢、嫩葉。	草莓幼株期開始至採收期
苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮	茶樹	10~12月	否	茶捲葉蛾類	全年，一年6-7世代	葉片	葉片因幼蟲吐絲而捲葉；2~3葉片黏著而有淡褐色食痕。
苗栗縣	竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、二義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮	茶樹	10~12月	否	茶小綠葉蟬	全年，一年14世代	嫩芽葉	危害初期，危害嫩芽葉造成黃綠色
臺中市	霧峰區、太平區	龍眼	3~4月	否	龍眼椿象類	全年，4~10月大量若蟲。	枝梢、花穗。	椿象若蟲期，約2~3月至龍眼花期前。
臺中市	霧峰區、太平區	荔枝	2~3月	否	荔枝椿象類	全年，4~10月大量若蟲。	枝梢、花穗。	椿象若蟲期，約2~3月。
臺中市	豐原區、東勢區	柑橘類	2~3月	是	介殼蟲類	全年	枝梢	全年
臺中市	豐原區、東勢區	柑橘類	2~3月	是	薊馬類	全年	枝梢、花	全年
臺中市	豐原區、東勢區	柑橘類	2~3月	是	木蟲、刺粉蟲	全年	枝梢	全年
臺中市	豐原區、東勢區	柑橘類	2~3月	是	潛葉蛾	全年	枝梢、葉片	全年
臺中市	豐原區、東勢區	柑橘類	2~3月	是	柑桔葉蟻	全年	枝梢	全年
彰化縣	芬園鄉	龍眼	3~4月	否	龍眼椿象類	全年，4~10月大量若蟲。	枝梢、花穗。	椿象若蟲期，約2~3月至龍眼花期前。
彰化縣	芬園鄉	荔枝	2~3月	否	荔枝椿象類	全年，4~10月大量若蟲。	枝梢、花穗。	椿象若蟲期，約2~3月。

南投縣	名間鄉、魚池鄉、仁愛鄉	茶樹	9~12月	否	薊馬類	一年發生十四代，以4~5月時之族群密度最高，其次為8~9月	嫩葉	嫩葉背面銼吸汁液，挫傷部位形成條狀褐斑
南投縣	名間鄉、魚池鄉、仁愛鄉	茶樹	9~12月	否	茶小綠葉蟬	全年，一年14世代	嫩芽葉	危害初期，危害嫩芽葉造成黃綠色
南投縣	名間鄉、魚池鄉、仁愛鄉	茶樹	9~12月	否	茶捲葉蛾類	全年，一年6-7世代	葉片	葉片因幼蟲吐絲而捲葉；2~3葉片黏著而有淡褐色食痕。
嘉義縣	竹崎鄉、梅山鄉、大林鎮、中埔鄉、番路鄉	柑橘類	2~4月	否	薊馬類	全年，新梢期、花期、小果期。	枝梢、花穗、小果。	花期前至幼果期，約1月至5月。
嘉義縣	竹崎鄉	龍眼	3~4月	否	龍眼椿象類	全年，4~10月大量若蟲。	枝梢、花穗。	椿象若蟲期，約2~3月至龍眼花期前。
嘉義縣	番路鄉、梅山鄉、竹崎鄉、阿里山鄉、中埔鄉、大埔鄉、水上鄉、鹿草鄉、太保市、朴子市、東石鄉、六腳鄉、新港鄉、民雄鄉、大林鎮、溪口鄉、義竹鄉	水稻	5~6月	否	二化螟	一期作	穗、葉片、莖	分蘗期至孕穗期
嘉義縣	番路鄉、梅山鄉、竹崎鄉、阿里山鄉、中埔鄉、大埔鄉、水上鄉、鹿草鄉、太保市、朴子市、東石鄉、六腳鄉、新港鄉、民雄鄉、大林鎮、溪口鄉、義竹鄉	水稻	10~11月	否	二化螟	一期作	穗、葉片、莖	分蘗期至孕穗期
嘉義縣	番路鄉、梅山鄉、竹崎鄉、阿里山鄉、中埔鄉、大埔鄉、水上鄉、鹿草鄉、太保市、朴子市、東石鄉、六腳鄉、新港鄉、民雄鄉、大林鎮、溪口鄉、義竹鄉	水稻	5~6月	否	瘤野螟	二期作	葉片	分蘗期至抽穗期
嘉義縣	番路鄉、梅山鄉、竹崎鄉、阿里山鄉、中埔鄉、大埔鄉、水上鄉、鹿草鄉、太保市、朴子市、東石鄉、六腳鄉、新港鄉、民雄鄉、大林鎮、溪口鄉、義竹鄉	水稻	10~11月	否	瘤野螟	二期作	葉片	分蘗期至抽穗期
嘉義縣	番路鄉、梅山鄉、竹崎鄉、阿里山鄉、中埔鄉、大埔鄉、水上鄉、鹿草鄉、太保市、朴子市、東石鄉、六腳鄉、新港鄉、民雄鄉、大林鎮、溪口鄉、義竹鄉	水稻	5~6月	否	褐飛蝨	二期作	莖	分蘗期至孕穗期
嘉義縣	番路鄉、梅山鄉、竹崎鄉、阿里山鄉、中埔鄉、大埔鄉、水上鄉、鹿草鄉、太保市、朴子市、東石鄉、六腳鄉、新港鄉、民雄鄉、大林鎮、溪口鄉、義竹鄉	水稻	10~11月	否	褐飛蝨	二期作	莖	分蘗期至孕穗期
嘉義縣	梅山鄉	茶樹	9~12月	否	薊馬類	一年發生十四代，以4~5月時之族群密度最高，其次為8~9月	嫩葉	嫩葉背面銼吸汁液，挫傷部位形成條狀褐斑
嘉義縣	梅山鄉	茶樹	9~12月	否	茶小綠葉蟬	全年，一年14世代	嫩芽葉	危害初期，危害嫩芽葉造成黃綠色
嘉義縣	梅山鄉	茶樹	9~12月	否	茶捲葉蛾類	全年，一年6-7世代	葉片	葉片因幼蟲吐絲而捲葉；2~3葉片黏著而有淡褐色食痕。
嘉義縣	新港鄉	胡瓜	全年	是	銀葉粉蝨	全年發生	葉片	全期
嘉義縣	水上鄉	南瓜	10~翌年3月	否	銀葉粉蝨	全年發生	葉片	全期
嘉義縣	中埔鄉	絲瓜	3~10月	是	銀葉粉蝨	全年發生	葉片	全期
嘉義縣	義竹鄉	洋香瓜	3~5月	否	銀葉粉蝨	全年發生	葉片	全期
嘉義縣	義竹鄉	洋香瓜	9~11月	否	銀葉粉蝨	全年發生	葉片	全期

雲林縣	古坑鄉、斗南鎮、斗六市	柑橘類	2~4月	否	薊馬類	全年、新梢期、花期、小果期。	枝梢、花穗、小果。	花期前至幼果期、約1月至5月。
雲林縣	斗南鎮、大埤鄉、虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、東勢鄉、臺西鄉、崙背鄉、麥寮鄉、斗六市、林內鄉、古坑鄉、荖桐鄉、西螺鎮、二崙鄉、北港鎮、水林鄉、口湖鄉、四湖鄉、二崙鄉	水稻	5~6月	否	二化螟	一期作	穗、葉片、莖	分蘗期至孕穗期
雲林縣	斗南鎮、大埤鄉、虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、東勢鄉、臺西鄉、崙背鄉、麥寮鄉、斗六市、林內鄉、古坑鄉、荖桐鄉、西螺鎮、二崙鄉、北港鎮、水林鄉、口湖鄉、四湖鄉、二崙鄉	水稻	10~11月	否	二化螟	一期作	穗、葉片、莖	分蘗期至孕穗期
雲林縣	斗南鎮、大埤鄉、虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、東勢鄉、臺西鄉、崙背鄉、麥寮鄉、斗六市、林內鄉、古坑鄉、荖桐鄉、西螺鎮、二崙鄉、北港鎮、水林鄉、口湖鄉、四湖鄉、二崙鄉	水稻	5~6月	否	瘤野螟	二期作	葉片	分蘗期至抽穗期
雲林縣	斗南鎮、大埤鄉、虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、東勢鄉、臺西鄉、崙背鄉、麥寮鄉、斗六市、林內鄉、古坑鄉、荖桐鄉、西螺鎮、二崙鄉、北港鎮、水林鄉、口湖鄉、四湖鄉、二崙鄉	水稻	10~11月	否	瘤野螟	二期作	葉片	分蘗期至抽穗期
雲林縣	斗南鎮、大埤鄉、虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、東勢鄉、臺西鄉、崙背鄉、麥寮鄉、斗六市、林內鄉、古坑鄉、荖桐鄉、西螺鎮、二崙鄉、北港鎮、水林鄉、口湖鄉、四湖鄉、二崙鄉	水稻	5~6月	否	褐飛蝨	二期作	莖	分蘗期至孕穗期
雲林縣	斗南鎮、大埤鄉、虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、東勢鄉、臺西鄉、崙背鄉、麥寮鄉、斗六市、林內鄉、古坑鄉、荖桐鄉、西螺鎮、二崙鄉、北港鎮、水林鄉、口湖鄉、四湖鄉、二崙鄉	水稻	10~11月	否	褐飛蝨	二期作	莖	分蘗期至孕穗期
雲林縣	古坑鄉	番石榴	6~8月	是	薊馬類	全年、新梢期、花期、小果期。	枝梢、花穗、小果。	花期前至幼果期、約5月至8月。
雲林縣	虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉、褒忠鄉	玉米	5~6月	否	玉米螟	全年全期	莖、葉、穗	幼苗到吐絲期
雲林縣	虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉、褒忠鄉	玉米	11~12月	否	玉米螟	全年全期	莖、葉、穗	幼苗到吐絲期
雲林縣	虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉、褒忠鄉	玉米	5~6月	否	夜蛾類	全年、全期	葉、穗	幼苗到吐絲期
雲林縣	虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉、褒忠鄉	玉米	11~12月	否	夜蛾類	全年、全期	葉、穗	幼苗到吐絲期
雲林縣	虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉、褒忠鄉	玉米	5~6月	否	蚜蟲類	全年生育後期	莖、葉、穗	幼苗到吐絲期
雲林縣	虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉、褒忠鄉	玉米	11~12月	否	蚜蟲類	全年生育後期	莖、葉、穗	幼苗到吐絲期
雲林縣	元長鄉	胡瓜	全年	是	銀葉粉蝨	全年發生	葉片	全期
雲林縣	崙背鄉	南瓜	10~翌年3月	否	銀葉粉蝨	全年發生	葉片	全期
雲林縣	二崙鄉、崙背鄉、西螺	西瓜	3~4月	否	銀葉粉蝨	全年發生	葉片	全期
雲林縣	二崙鄉、崙背鄉、西螺	西瓜	9~10月	否	銀葉粉蝨	全年發生	葉片	全期
雲林縣	崙背鄉	洋香瓜	3~5月	否	銀葉粉蝨	全年發生	葉片	全期
雲林縣	崙背鄉	洋香瓜	9~11月	否	銀葉粉蝨	全年發生	葉片	全期

臺南市	中西區、東區、南區、北區、安平區、安南區、永康區、歸仁區、新化區、左鎮區、玉井區、楠西區、南化區、仁德區、關廟區、龍崎區、官田區、麻豆區、佳里區、西港區、七股區、將軍區、學甲區、北門區、新營區、後壁區、白河區、東山區、六甲區、下營區、柳營區、鹽水區、善化區、	水稻	5~6月	否	二化螟	一期作	穗、葉片、莖	分蘗期至孕穗期
臺南市	中西區、東區、南區、北區、安平區、安南區、永康區、歸仁區、新化區、左鎮區、玉井區、楠西區、南化區、仁德區、關廟區、龍崎區、官田區、麻豆區、佳里區、西港區、七股區、將軍區、學甲區、北門區、新營區、後壁區、白河區、東山區、六甲區、下營區、柳營區、鹽水區、善化區、	水稻	10~11月	否	二化螟	一期作	穗、葉片、莖	分蘗期至孕穗期
臺南市	中西區、東區、南區、北區、安平區、安南區、永康區、歸仁區、新化區、左鎮區、玉井區、楠西區、南化區、仁德區、關廟區、龍崎區、官田區、麻豆區、佳里區、西港區、七股區、將軍區、學甲區、北門區、新營區、後壁區、白河區、東山區、六甲區、下營區、柳營區、鹽水區、善化區、	水稻	5~6月	否	瘤野螟	二期作	葉片	分蘗期至抽穗期
臺南市	永康區、歸仁區、新化區、左鎮區、玉井區、楠西區、南化區、仁德區、關廟區、龍崎區、官田區、麻豆區、佳里區、西港區、七股區、將軍區、學甲區、北門區、新營區、後壁區、白河區、東山區、六甲區、下營區、柳營區、鹽水區、善化區、大內	水稻	10~11月	否	瘤野螟	二期作	葉片	分蘗期至抽穗期
臺南市	永康區、歸仁區、新化區、左鎮區、玉井區、楠西區、南化區、仁德區、關廟區、龍崎區、官田區、麻豆區、佳里區、西港區、七股區、將軍區、學甲區、北門區、新營區、後壁區、白河區、東山區、六甲區、下營區、柳營區、鹽水區、善化區、大內	水稻	5~6月	否	褐飛蝨	二期作	莖	分蘗期至孕穗期

臺南市	永康區、歸仁區、新化區、左鎮區、玉井區、楠西區、南化區、仁德區、關廟區、龍崎區、官田區、麻豆區、佳里區、西港區、七股區、將軍區、學甲區、北門區、新營區、後壁區、白河區、東山區、六甲區、下營區、柳營區、鹽水區、善化區、大內區	水稻	10~11月	否	褐飛蝨	二期作	莖	分蘗期至孕穗期
臺南市	楠西區、玉井區、南化區、大內區	番石榴	6~8月	是	薊馬類	全年，新梢期、花期、小果期。	枝梢、花穗、小果。	花期前至幼果期，約5月至8月。
臺南市	麻豆區、下營區、柳營區、東山區、六甲區、大內區、白河區	柑橘類	2~4月	否	薊馬類	全年，新梢期、花期、小果期。	枝梢、花穗、小果。	花期前至幼果期，約1月至5月。
臺南市	南化區、東山區、楠西區、	龍眼	3~4月	否	龍眼椿象類	全年，4~10月大量若蟲。	枝梢、花穗。	椿象若蟲期，約2~3月至龍眼花期前。
臺南市	安定區、歸仁區、善化區、麻豆區	西瓜	3~4月	否	銀葉粉蝨	全年發生	葉片	全期
臺南市	安定區、歸仁區、善化區、麻豆區	西瓜	9~10月	否	銀葉粉蝨	全年發生	葉片	全期
臺南市	東山區	絲瓜	3~10月	是	銀葉粉蝨	全年發生	葉片	全期
臺南市	東山區、後壁區、白河區、北門區	洋香瓜	3~5月	否	銀葉粉蝨	全年發生	葉片	全期
臺南市	東山區、後壁區、白河區、北門區	洋香瓜	9~11月	否	銀葉粉蝨	全年發生	葉片	全期
高雄市	六龜區、那瑪夏區	茶樹	11~翌年1月	否	茶小綠葉蟬	全年，乾燥溫暖氣候	新梢、嫩葉	生育初期至採收前6天。
高雄市	那瑪夏區	茶樹	11~翌年1月	否	茶餅病	低溫潮濕氣候	嫩葉、嫩芽	生育初期至採收前6天。
高雄市	美濃區	水稻	3~4月	否	二化螟	一期稻受害較二期稻嚴重	莖	藥劑處理可於測得螟蛾發生盛期後7天實施或依據田間稻株側黃葉之出現，在分蘗期側黃葉率達10%，孕穗期達1%時即有防治
高雄市	美濃區	水稻	3~4月	否	瘤野螟	族群高峰出現於水稻抽穗以後。	葉	每叢水稻具三齡以上幼蟲1隻即可進行藥劑防治。
高雄市	內門區、田寮區	龍眼	3~4月	否	膠蟲	全年，12-1月及5-6月為初齡若蟲	枝條	初齡若蟲發生時。
高雄市	內門區、田寮區	龍眼	3~4月	否	龍眼椿象類	全年，2-6月為其卵期。	枝梢、花穗	於龍眼花期前防治已越冬之成蟲或剛孵化之若蟲。
高雄市	內門區、田寮區	龍眼	3~4月	否	介殼蟲類	全年，乾燥溫暖氣候易大量發生。	枝、葉、果	龍眼開花前的乾旱季節須注意害蟲密度，於發生初期即須防
高雄市	內門區、田寮區	龍眼	3~4月	否	鱗翅目蛾類	全年，乾燥溫暖氣候易大量發生。	枝梢、葉、花穗、果實	龍眼開花前的乾旱季節須注意害蟲密度，於發生初期即須防
高雄市	大樹區、旗山區	荔枝	1~2月	否	膠蟲	全年，12-1月及5-6月為初齡若蟲	枝條	初齡若蟲發生時。
高雄市	大樹區、旗山區	荔枝	1~2月	否	荔枝椿象類	全年，2-6月為其卵期。	枝梢、花穗	於荔枝花期前防治已越冬之成蟲或剛孵化之若蟲。
高雄市	大樹區、旗山區	荔枝	1~2月	否	介殼蟲類	全年，乾燥溫暖氣候易大量發生。	枝、葉、果	荔枝開花前的乾旱季節須注意害蟲密度，於發生初期即須防
高雄市	大樹區、旗山區	荔枝	1~2月	否	鱗翅目蛾類	全年，乾燥溫暖氣候易大量發生。	枝梢、葉、花穗、果實	龍眼開花前的乾旱季節須注意害蟲密度，於發生初期即須防
高雄市	燕巢區、大社區	番石榴	全年	是	介殼蟲類	全年，乾燥溫暖氣候易大量發生。	枝、葉、果	番石榴開花前的乾旱季節須注意害蟲密度，於發生初期即須防
屏東縣	滿洲鄉、高樹鄉	茶樹	11~翌年1月	否	茶小綠葉蟬	全年，乾燥溫暖氣候	新梢、嫩葉	生育初期至採收前6天。

屏東縣	萬丹鄉	水稻	3~4月	否	二化螟	一期稻受害較二期稻嚴重	莖	藥劑處理可於測得螟蛾發生盛期後7天實施或依據田間稻株側黃葉之出現，在分蘗期側黃葉率達10%，孕穗期達1%時即有防治
屏東縣	萬丹鄉	水稻	3~4月	否	瘤野螟	族群高峰出現於水稻抽穗以後。	葉	每叢水稻具三齡以上幼蟲1隻即可進行藥劑防治。
屏東縣	新園鄉、高樹鄉	玉米	10~11月	否	薊馬類	氣候乾燥溫暖時易大量發生。	葉	玉米抽穗前的乾旱季節須注意害蟲密度，於發生初期即須防
屏東縣	新園鄉、高樹鄉	玉米	10~11月	否	鱗翅目蛾類	氣候乾燥溫暖時易大量發生。	葉、花、果	玉米種植後即須注意害蟲密度，於發生初期即須防治。
屏東縣	佳冬鄉、南州鄉	蓮霧	10~翌年3月	是	薊馬類	全年，乾燥溫暖氣候及萌新芽時易大量發生。	新梢、嫩葉及幼果	蓮霧開花前的乾旱季節須注意害蟲密度，於發生初期即須防
屏東縣	佳冬鄉、南州鄉	蓮霧	10~翌年3月	是	介殼蟲類	全年，乾燥溫暖氣候易大量發生。	枝、葉、果	蓮霧開花前的乾旱季節須注意害蟲密度，於發生初期即須防
屏東縣	佳冬鄉、南州鄉	蓮霧	10~翌年3月	是	鱗翅目蛾類	全年，乾燥溫暖氣候易大量發生。	葉、花、果	蓮霧開花前的乾旱季節須注意害蟲密度，於發生初期即須防
屏東縣	高樹鄉、九如鄉	檸檬	2~3月	是	葉蟬類	全年，乾燥溫暖氣候及萌新芽時易大量發生。	枝、葉、果	於春、秋季萌新芽時即須注意害蟲密度，於發生初期進行防
屏東縣	高樹鄉、九如鄉	檸檬	2~3月	是	銹婢類	全年，乾燥溫暖氣候及萌新芽時易大量發生。	枝、葉、果	於春、秋季萌新芽時即須注意害蟲密度，於發生初期進行防
屏東縣	高樹鄉、九如鄉	檸檬	2~3月	是	薊馬類	全年，乾燥溫暖氣候及萌新芽時易大量發生。	新梢、嫩葉及幼果	檸檬開花前的乾旱季節須注意害蟲密度，於發生初期即須防
屏東縣	高樹鄉、九如鄉	檸檬	2~3月	是	介殼蟲類	全年，乾燥溫暖氣候易大量發生。	枝、葉、果	檸檬開花前的乾旱季節須注意害蟲密度，於發生初期即須防
屏東縣	高樹鄉、九如鄉	檸檬	2~3月	是	鱗翅目蛾類	全年，乾燥溫暖氣候易大量發生。	葉、花、果	檸檬開花前的乾旱季節須注意害蟲密度，於發生初期即須防
臺東縣	鹿野鄉、太麻里鄉、卑南鄉、海端鄉	茶樹	11~翌年1月	否	茶小綠葉蟬	全年，乾燥溫暖氣候	新梢、嫩葉	生育初期至採收前6天。
臺東縣	太麻里鄉、海端鄉	茶樹	11~翌年1月	否	茶餅病	低溫潮濕氣候	嫩葉、嫩芽	生育初期至採收前6天。
臺東縣	鹿野鄉、卑南鄉	茶樹	11~翌年1月	否	薊馬類	乾燥溫暖氣候	新梢、嫩葉	生育初期至採收前12天。
臺東縣	東河鄉、成功鎮	柑橘類	3~4月	否	薊馬類	全年，乾燥溫暖氣候。	花、新梢、幼果	柑桔花期至幼果期，3-5月。
臺東縣	鹿野鄉、卑南鄉	枇杷	10~11月	否	薊馬類	全年，乾燥溫暖氣候。	花、新梢、幼果	花期至幼果期，10-12月
花蓮縣	瑞穗鄉、玉里鄉、富里鄉	茶樹	11~翌年1月	否	茶小綠葉蟬	全年，乾燥溫暖氣候	新梢、嫩葉	生育初期至採收前6天。
花蓮縣	玉里鄉、富里鄉	茶樹	11~翌年1月	否	茶餅病	低溫潮濕氣候	嫩葉、嫩芽	生育初期至採收前6天。
花蓮縣	瑞穗鄉	文旦	3~4月	否	蚜蟲、介殼蟲	全年，降雨量低且溫暖氣候。	葉片、枝條、果實	全年
花蓮縣	瑞穗鄉	文旦	3~4月	否	葉蟬類	溫熱乾燥季節	葉背、小果表面	春夏
花蓮縣	瑞穗鄉	文旦	3~4月	否	潛葉蛾	抽新梢時期	嫩葉	春、夏
花蓮縣	瑞穗鄉	文旦	3~4月	否	薊馬類	花期、小果期	花、小果	花期、小果期
花蓮縣	新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉	水稻	4~5月	否	水稻飛蟲類	全年，降雨量低且溫暖氣候。	稻株基部、葉片	水稻分蘗盛期至齊穗期
花蓮縣	新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉	水稻	4~5月	否	斑飛蟲	全年，降雨量低且溫暖氣候。	稻株上半部或穗部	水稻分蘗盛期至齊穗期
花蓮縣	新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉	水稻	8~9月	否	斑飛蟲	全年，降雨量低且溫暖氣候。	稻株上半部或穗部	水稻分蘗盛期至齊穗期
花蓮縣	新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉	水稻	4~5月	否	黑尾葉蟬	全年，降雨量低且溫暖氣候。	稻株基部	水稻分蘗盛期至齊穗期

花蓮縣	新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、富里	水稻	8~9月	否	黑尾葉蟬	全年，降雨量低且溫暖氣候。	稻株基部	水稻分蘗盛期至齊穗期
宜蘭縣	冬山鄉	文旦	3~4月	否	葉蟬類	溫熱乾燥季節	葉背、小果表面	春夏
宜蘭縣	冬山鄉	文旦	3~4月	否	蚜蟲、介殼蟲	全年，降雨量低且溫暖氣候。	葉片、枝條、果實	全年
宜蘭縣	冬山鄉	文旦	3~4月	否	潛葉蛾	抽新梢時期	嫩葉	春、夏
宜蘭縣	冬山鄉	文旦	3~4月	否	薊馬類	花期、小果期	花、小果	花期、小果期
宜蘭縣	頭城鎮、員山鄉	番石榴	4~7月	是	薊馬類	終年發生，乾旱季節較多	葉部及果實	以春芽至開花期為害
宜蘭縣	宜蘭市、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、羅東鎮、三星鄉、大同鄉、五結鄉、冬山鄉、蘇澳鎮、南澳鄉	茶樹	10~12月	否	茶捲葉蛾類	全年，一年6-7世代	葉片	葉片因幼蟲吐絲而捲葉；2~3葉片黏著而有淡褐色食痕。
宜蘭縣	三星鄉	梨	1~2月	是	介殼蟲類	全年	樹幹、分枝及小枝	冬季落葉後至春季萌芽或嫁接前後
宜蘭縣	三星鄉	梨	1~2月	是	梨木蝨	2-4月	樹嫩稍、葉、葉柄	全年可見發生，春季梨樹發芽時，深色型越冬成蟲開始產卵
宜蘭縣	三星鄉	梨	1~2月	是	梨桑擬輪盾介殼蟲	全年	樹幹、分枝及小枝	冬季落葉後至春季萌芽或嫁接前後
宜蘭縣	三星鄉	梨	1~2月	是	梨齒盾介殼蟲	全年	樹幹、分枝及小枝	冬季落葉後至春季萌芽或嫁接前後
宜蘭縣	員山鄉	蓮霧	2~3月	是	捲葉蛾	3-4月	頂芽、嫩芽、花蕾及	蟲整年除冬季密度較低外均可見其危害