

番荔枝病蟲害防治方法

98.04.16

防治對象	防治方法					
	農藥防治					備註
	使用藥劑種類	每公頃 每次 用藥量 (公升)	稀釋 倍數	安全 採收 天數	注意事項	
褐根病 根朽病	目前尚無正式推薦藥劑					
太平洋腎紋 粉介殼蟲	48.34%丁基加保扶乳劑	0.75-1.0	1,000	16 天	1. 強剪後發芽前可混合95%夏油100倍。 發芽後不可混用95%夏油，以免藥害。 2. 強剪廢棄枝條葉片若無法燒燬時，必須同時徹底防治一次。 3. 上述各藥劑任選一種。	丁基加保扶可兼防治蚜蟲、鱗翅目、粉蝨類害蟲
	20%亞滅培水溶性粉劑	0.3~0.5	2,500	6 天		亞滅培可兼防治蚜蟲、薊馬類、粉蝨類等害蟲
	24%納乃得溶液	1.5~2.0	1,000	10 天		納乃得可兼防治蚜蟲、鱗翅目、粉蝨類等害蟲
	20%達特南水溶性粒劑	0.4~0.5	2,000	15 天		達特南可兼防治蚜蟲類、薊馬類、粉蝨類等害蟲
	75%陶斯松水分散粒劑	0.3~0.5	3,000	12 天		陶斯松可兼防治粉介殼蟲、褐圓介殼蟲、鱗翅目等害蟲
褐圓介殼蟲 黃點介殼蟲 長介殼蟲	參考太平洋腎紋粉介殼蟲推薦藥劑					
薊馬	2.8%畢芬寧乳劑	0.75~1.0	1,000	6 天	1. 施藥時應噴及嫩葉。 2. 害蟲於嫩葉心葉發時，每隔7天施藥一次，連續三~四次。	畢芬寧可兼防治粉蝨、蚜蟲類、葉蟎類、鱗翅目等害蟲
	2.5%畢芬寧水懸劑	0.75~1.0	1,000	6 天		同上
	9.6%益達胺溶液	0.5~0.75	1,500	9 天		益達胺可兼防治粉蝨蟲、蚜蟲類等害蟲
	2.8%賽洛寧乳劑	0.3~0.5	2,000	6 天		賽洛寧可兼防治蚜蟲類、二點葉蟎、鱗翅目等害蟲
	2.5%賽洛寧微乳劑	0.35~0.5	2,000	6 天		同上
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	0.35~0.5	2,000	6 天		同上
	34%硫敵克水懸劑	0.5~0.75	1,500	12 天		硫敵克可兼防治鱗翅目害蟲
蚜蟲	參考太平洋腎紋粉介殼蟲推薦藥劑					
粉蝨	參考太平洋腎紋粉介殼蟲推薦藥劑					

防治對象	防治方法					
	農藥防治					備註
	使用藥劑種類	每公頃 每次 用藥量 (公升)	稀釋 倍數	安全 採收 天數	注意事項	
葉蟬	1%密滅汀乳劑	1~1.5	1,500	6天		密滅汀可兼防治 蚜蟲類害蟲
	50%馬拉松乳劑	0.7~1.0	1000	15天		馬拉松可兼防治 粉蝨、蚜蟲、介 殼蟲等害蟲
	20%畢達本可濕性粉劑	0.4~0.5	2000	12天		
	10%芬普寧可濕性粉劑	0.7~1.0	1000	12天		芬普寧可兼防治 鱗翅目害蟲
	4%畢汰芬水懸劑	0.4~0.5	2000	9天		
斑螟蛾	2.4%第滅寧水懸劑	1.0~1.5	1,500	3天	1.上述各藥劑 各任選一種 即可。 2.請於小果期 (果徑3-4公 分)時使用。	第滅寧兼防治蚜 蟲類、鱗翅 目、東方果實 蠅類等害蟲
	42%益洛寧可濕性粉劑	1.0~1.5	1,500	6天		
東方果實蠅	20%芬化利乳劑	0.5~0.75	2,000	9天	對蜜蜂具毒 性。 具中度口服及 膚急毒性微皮 膚眼刺激性。	
	50%芬殺松乳劑	1.0~1.5	1,000	6天		
青枯病	目前尚無正式推薦藥劑					
果腐病 (黑腐病)	50%枯草桿菌可濕性粉劑	0.5	800	免訂		賽普護汰寧可兼 防治炭疽病
	62.5%賽普護汰寧水分散 粒劑	0.5~0.75	1500	12天		
炭疽病	目前尚無正式推薦藥劑					同上
果疫病	80%福賽得水分散性粒劑	3.0~4.0	500	12天		1.清除病果集中 燒燬 2.以亞磷酸 (H ₃ PO ₃)與氫氧 化鉀(KOH)以 1:1中和之,1,000 倍具預防效果, 請於小果期施用
	76.5%銅滅達樂可濕性粉 劑	1.5~2.0	1,000	12天		

*可濕性硫黃粉劑核准用於防治柑桔與荔枝銹蟎(蟬)，且免訂殘留容許量，可參考使用於防治番荔枝葉蟬及銹蟎(蟬)。